

Prior to use, carefully read the instructions for use. **EN**

GC Fuji TRIAGE™ CAPSULE

RADIOPAQUE GLASS IONOMER PROTECTION AND TEMPORARY RESTORATIVE MATERIAL IN CAPSULES

For use only by a dental professional in the indications for use.

INDICATIONS FOR USE

1. Fissure protection
2. Root surface protection.
3. Hypersensitivity prevention and control.
4. Protection for immature enamel.
5. Temporary filling of endodontic access.
6. Intermediate restorations.

CONTRAINDICATIONS

1. Direct pulp capping.
2. Avoid use of this product in patients with known glass ionomer cement allergies.

COMPOSITION

Powder: Fluoro-alumino-silicate glass, pigment
Liquid: Water, polyacrylic acid, carboxylic acid

DIRECTIONS FOR USE

PINK Shade is command set, WHITE Shade is chemical set only.

Powder / Liquid Ratio (g/g)	0.30 / 0.15
Mixing Time (sec.)	10"
Working Time (23°C/73°F) (min., sec.)	140"
Net Setting Time (37°C/99°F) (min., sec.)	2'30"
Finishing Time (37°C/99°F, from start of mixing) (min., sec.)	6'00"
Finishing Time (if light cured (PINK Command set) (37°C/99°F, from start of mixing) (min., sec.)	4'00"

ISO 9917-1 Glass polyalkenoate cement, Restoration

A. FISSURE PROTECTION

ROOT SURFACE PROTECTION

HYPERSENSITIVITY PREVENTION AND CONTROL

PROTECTION FOR IMMATURE ENAMEL

1. Preparation of the tooth surfaces (e.g. for fissure protection or root surface protection)
- a) After cleaning the tooth surfaces (prophylaxis with pumice and water) in a usual manner, rinse thoroughly with water. Avoid aggravating the operculum.

Note:
If extra retention is desired, application of CAVITY CONDITIONER (10 seconds) or DENTIN CONDITIONER (20 seconds) is recommended. The conditioner should be rinsed off thoroughly after application.
Do dry by blotting with a cotton pellet or gently blowing with an air syringe (Fig. A-1). DO NOT DESICCAT. Best results are obtained when prepared surfaces appear moist (glistening).

2. Mixing

- a) Before activation, shake the capsule or tap its side on a hard surface to loosen the powder (Fig. A-2).
- b) To activate the capsule, push the plunger until it is fully depressed with the main body and hold it down for 2 seconds (Fig. A-3).

- Note:
1) Ensure the plunger is fully pressed to avoid the incorrect mixing ratio of powder and liquid.
- 2) The capsule should be activated just before mixing and used immediately.
- c) Immediately set it into a mixer (or an amalgamator) and mix for 10 seconds (≈ 4.000 RPM) (Fig. A-4).

3. Placement

- a) Immediately remove the mixed capsule from the mixer and load it into the GC CAPSULE APPLIER.
- b) Click twice to prime the capsule, then dispense (Fig. A-5). The working time is 1 minute 40 seconds from the start of mixing at 23°C (73°F). Higher temperatures will shorten working time.
- c) Extrude the mixture onto the tooth surface (Fig. A-6) then use a brush to spread a thin film of GC Fuji TRIAGE CAPSULE directly over the root surface or hypersensitive area or over the occlusal surface and into the pits and fissures.

- Note:
1) If a faster set is desired, use a visible light curing device* for 20-40 seconds. Place light source as closely as possible to the cement surface. This function applies only to the Pink Shade. After light cure, it is advisable to protect the surface with a varnish.
- 2) To adjust the direction of the light curing device, turn the capsule towards you and turn the capsule body.
- 3) To remove the used capsule, push the applicator release button. Twist the capsule and pull upwards.

- d) After placement, when the material starts to lose the glossy appearance (or after curing with the light curing device), apply GC Fuji VARNISH (flow dry) or GC Fuji COAT LC (light cure) to the sealed area and dry the margins using a cotton pellet or sponge (Fig. A-7).
- e) Finishing under air/water spray can be performed 6 minutes from start of mix (chemically set) or 4 minutes if light cured. Use a superfine diamond bur or a silicone finishing point (Fig. A-8).

- f) Apply GC Fuji VARNISH or GC Fuji COAT LC to the area again (Fig. A-9).

B. TEMPORARY FILLING OF ENDODONTIC ACCESS

1. Cleaning the pulp chamber
- a) After appropriate pulp treatment, clean and gently dry the pulp chamber with an air syringe (Fig. B-1).

- b) Fill the chamber with a cotton pellet (Fig. B-2).

2. Mixing

- See directions in A (above), Section 2.

3. Placement

- See directions in A, Section 3, a and b.

- b) Extrude the mixture directly over the cotton pellet (Fig. B-3).

- Note:
If a faster set is desired, use a visible light curing device* for 20-40 seconds. Place light source as closely as possible to the cement surface. This function applies only to the Pink Shade. After light cure, it is advisable to protect the surface with a varnish.

- c) Moisture protection and Finishing
- See directions in A, Section 3, d, e and f.

C. INTERMEDIATE RESTORATIONS

1. Caries removal
- a) Remove caries and loose debris with hand instruments.
- b) For better retention, it is recommended to gently clean the carious surface with CAVITY CONDITIONER for 10 seconds or DENTIN CONDITIONER for 20 seconds.

- c) Rinse thoroughly with water. Dry by blotting with a cotton pellet or gently blowing with an air syringe (Fig. C-1). DO NOT DESICCAT. Best results are obtained when prepared surfaces appear moist (glistening).

2. Mixing

- See directions in A (above), Section 2.

3. Placement

- See directions in A, Section 3, a and b.

- b) Extrude the mixture directly over the prepared lesion or both surface (Fig. C-2). Form the contour and if possible cover with a matrix.

- Note:
If a faster set is desired, use a visible light curing device* for 20-40 seconds. Place light source as closely as possible to the cement surface. This function applies only to the Pink Shade. After light cure, it is advisable to protect the surface with a varnish.

- c) See directions in A, Section 3, d, e and f.

- NOTE:
The initial set of GC Fuji TRIAGE CAPSULE PINK can be accelerated using the energy from a visible light curing device (LED / Halogen > 700 mW/cm²).

SHADE

PINK, White

STORAGE

Recommended for optimal performance, store in a cool and dark place (4-25°C / 39-77°F).

PACKAGING

50 capsules
Average contents per capsule: 0.30 g powder and 0.15 g (0.12 mL) liquid
Minimum net volume of mixed cement per capsule: 0.13 mL

CAUTION

1. In case of contact with oral tissue or skin, remove immediately with a sponge or cotton soaked in alcohol. Flush with water.

2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.

3. Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks and safety eyewear should always be worn.

4. In rare cases the product may cause sensitivity in some people. If any such reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a physician.

Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous according to GHS. Always familiarize yourself with the safety data sheets available at:

<https://www.gc.dental/europe> or for the Americas

<https://www.gc.dental/americas>

They can also be obtained from your supplier.

For the Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP) please see EUDAMED database (<https://ec.europa.eu/tools/eudamed>) or contact us at Regulatory.gcc@gc.dental

Undesired effects-Reporting:
If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events experienced by you or your patients, including those not listed in this instruction for use, please report them directly through the relevant vigilance system, by selecting the proper authority of your country accessible through the following link:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en as well as to our internal vigilance system: vigilance@gc.dental. In this way you will contribute to improve the safety of this product.

UK Responsible Person
GC UNITED KINGDOM Ltd
Coopers Court Newport Pagnell, Buckinghamshire, MK16 8JS, United Kingdom

Last revised: 10/2024

Rx Only

MANUFACTURED BY
GC CORPORATION
70-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan

RESPONSIBLE MANUFACTURER IN CANADA:
GC AMERICA INC.
3737 West 127th Street, Asip, IL 60803 U.S.A.

DISTRIBUTED BY
GC CORPORATION
70-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan

EU: GC EUROPE N.V.
Researchpark Haasrode-Leuven 1240, Interhavenlaan 33,
B-3001 Leuven, Belgium TEL: +32 16 79 14 00
GC AMERICA INC.
3737 West 127th Street, Asip, IL 60803 U.S.A.
TEL: +1 708 267 0800
www.gc.dental/america

GC AUSTRALIA PTY LTD
Researchpark Haasrode-Leuven 1240, Interhavenlaan 33,
B-3001 Leuven, Belgium TEL: +32 16 79 14 00
GC AMERICA INC.
3737 West 127th Street, Asip, IL 60803 U.S.A.
TEL: +1 708 267 0800
www.gc.dental/america

PRINTED IN JAPAN

Vor der Benutzung bitte die Gebrauchsanweisung gründlich lesen! **DE**

GC Fuji TRIAGE™ CAPSULE

RÖNTGENOPAKER GLASIONOMER-SCHUTZ- UND RESTAURATIONSZEMENT (TEMPORÄR) IN KAPSELN

Nur zur Verwendung durch zahnärztliches Fachpersonal gemäß den Anwendungshinweisen.

INDIKATIONEN ZUR ANWENDUNG

1. Fissurenversiegelung.
2. Schutz der Wurzeloberfläche.
3. Vorbeugung und Kontrolle von Hypersensibilisierung.
4. Schmelzschutz bei Hypokalifikation.
5. Temporärer Endo-Verschluss.
6. Provisorische Restaurationen.

GEGENANZEIGEN

1. Direkte Pulpaabkappung.
2. Dieses Produkt nicht bei Patienten mit bekannten Allergien gegenüber Glasionomer-Zement.

ZUSAMMENSETZUNG

Pulver: Fluor-Aluminosilikatglas, Pigment
Flüssigkeit: Wasser, Polyacrylsäure, Karbonsäure

GEBRAUCHSANWEISUNG

ROSA farbenes Material mit "on command" Härtung, ZAHNFARBENES Material mit nur chemischer Härtung.

Pulver- / Flüssigkeitsverhältnis (g/g)	0,30 / 0,15
Anmischzeit (Sek.)	10"
Verarbeitungszeit (23°C/73°F) (Min., Sek.)	140"
Netto Abbindezeit (37°C/99°F) (Min., Sek.)	2'30"
Beginn des endgültigen Finierens (37°C/99°F, ab Beginn des Anmischens) (Min., Sek.)	6'00"
Beginn des endgültigen Finierens nach Härtung mit Halogenlicht (ROSA, mit "on command" Härtung) (37°C/99°F, ab Beginn des Anmischens) (Min., Sek.)	4'00"

ISO 9917-1 Glas-Polyalkenoat-Zement, Restauration

A. FISSURENVERSIEGELUNG

SCHUTZ DER WURZELÖBERFLÄCHE

KONTROLLE UND SCHUTZ VON

HYPERSENSIBILITÄTEN

SCHMELZSCHUTZ BEI HYPOKALZIFIKATION

1. Vorbereitung der Zahnoberflächen (z.B. Schutz von Fissuren oder Wurzeloberflächen)
- a) Nach dem Reinigen der Zahnoberfläche (Prophylaxe mit Bimsstein und Wasser) in gewohnter Weise, sorgfältig mit Wasser abspülen. Die Gummendecke darf nicht reizen.

Hinweis:
Wird zusätzliche Haftung gewünscht, wird die Anwendung des CAVITY CONDITIONER (10 Sekunden) oder des DENTIN CONDITIONER (20 Sek.) empfohlen. Der Conditioner sollte nach der Applikation gründlich abgespült werden.

- b) Nach Abtupfen mit einem Watteputzer oder sauberes Bismut mit einer Luftspray trocknen (Abb. A-1). NICHT VÖLLIG ABTROCKNEN. Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn die Oberflächen leicht feucht erscheinen (glänzen).

2. Anmischen
- a) Vor der Aktivierung die Kapsel schütteln oder mit der Seite auf eine harte Oberfläche klopfen um das Pulver zu lösen (Abb. A-2).

- b) Um die Kapsel zu aktivieren den Kolben drücken bis dieser bündig mit dem Kapselkörper abschließt und für 2 Sekunden halten (Abb. A-3).

- Hinweis:
1) Sicherstellen dass der Kolben vollständig gedrückt ist um fehlerhaftes Anmischen von Pulver und Flüssigkeit zu vermeiden.

- 2) Die Kapsel sollte direkt vor Anmischen geöffnet und sofort verarbeitet werden.

- c) Sofort in den Kapselmischer geben (oder einen MAALGAMATISCHER) und für 10 Sekunden anmischen (≈ 4.000 RPM) (Abb. A-4).

3. Einsetzen
- a) am anmischende Kapsel sofort aus dem Mischer nehmen und in den GC CAPSULE APPLIER einsetzen.

- b) Die Kapsel mit zwei Klicks aktivieren, dann das Material ausdrücken (Abb. A-5). Die Verarbeitungszeit beträgt 1 Minute und 40 Sekunden ab Mischbeginn bei 23°C (73°F). Höhere Temperaturen verkürzen die Verarbeitungszeit.

- c) GC Fuji TRIAGE CAPSULE auf die Zahnoberfläche geben, und mit zweiten Schritt zu einer dünnen Schicht auf die Wurzeloberfläche und hypersensibilisierten Bereich oder die Fissuren verteilen (Abb. A-6). Hinweis:

- 1) Falls schnelleres Abbinden gewünscht wird, für 20-40 Sekunden eine Licht härteeinheit* verwenden. Die Lichtquelle so nahe wie möglich an die Zementoberfläche halten. Diese Methode funktioniert nur mit dem ROSA Material.

- 2) Die Kapsel mit zwei Klicks aktivieren, dann das Material ausdrücken (Abb. A-5). Die Verarbeitungszeit beträgt 1 Minute und 40 Sekunden ab Mischbeginn bei 23°C (73°F). Höhere Temperaturen verkürzen die Verarbeitungszeit.

- c) GC Fuji TRIAGE CAPSULE auf die Zahnoberfläche geben, und mit zweiten Schritt zu einer dünnen Schicht auf die Wurzeloberfläche und hypersensibilisierten Bereich oder die Fissuren verteilen (Abb. A-6). Hinweis:

- 1) Falls schnelleres Abbinden gewünscht wird, für 20-40 Sekunden eine Licht härteeinheit* verwenden. Die Lichtquelle so nahe wie möglich an die Zementoberfläche halten. Diese Methode funktioniert nur mit dem ROSA Material.

- 2) Die Kapsel mit zwei Klicks aktivieren, dann das Material ausdrücken (Abb. A-5). Die Verarbeitungszeit beträgt 1 Minute und 40 Sekunden ab Mischbeginn bei 23°C (73°F). Höhere Temperaturen verkürzen die Verarbeitungszeit.

- c) GC Fuji TRIAGE CAPSULE auf die Zahnoberfläche geben, und mit zweiten Schritt zu einer dünnen Schicht auf die Wurzeloberfläche und hypersensibilisierten Bereich oder die Fissuren verteilen (Abb. A-6). Hinweis:

- 1) Falls schnelleres Abbinden gewünscht wird, für 20-40 Sekunden eine Licht härteeinheit* verwenden. Die Lichtquelle so nahe wie möglich an die Zementoberfläche halten. Diese Methode funktioniert nur mit dem ROSA Material.

- 2) Die Kapsel mit zwei Klicks aktivieren, dann das Material ausdrücken (Abb. A-5). Die Verarbeitungszeit beträgt 1 Minute und 40 Sekunden ab Mischbeginn bei 23°C (73°F). Höhere Temperaturen verkürzen die Verarbeitungszeit.

- c) GC Fuji TRIAGE CAPSULE auf die Zahnoberfläche geben, und mit zweiten Schritt zu einer dünnen Schicht auf die Wurzeloberfläche und hypersensibilisierten Bereich oder die Fissuren verteilen (Abb. A-6). Hinweis:

- 1) Falls schnelleres Abbinden gewünscht wird, für 20-40 Sekunden eine Licht härteeinheit* verwenden. Die Lichtquelle so nahe wie möglich an die Zementoberfläche halten. Diese Methode funktioniert nur mit dem ROSA Material.

- 2) Die Kapsel mit zwei Klicks aktivieren, dann das Material ausdrücken (Abb. A-5). Die Verarbeitungszeit beträgt 1 Minute und 40 Sekunden ab Mischbeginn bei 23°C (73°F). Höhere Temperaturen verkürzen die Verarbeitungszeit.

- c) GC Fuji TRIAGE CAPSULE auf die Zahnoberfläche geben, und mit zweiten Schritt zu einer dünnen Schicht auf die Wurzeloberfläche und hypersensibilisierten Bereich oder die Fissuren verteilen (Abb. A-6). Hinweis:

- 1) Falls schnelleres Abbinden gewünscht wird, für 20-40 Sekunden eine Licht härteeinheit* verwenden. Die Lichtquelle so nahe wie möglich an die Zementoberfläche halten. Diese Methode funktioniert nur mit dem ROSA Material.

- 2) Die Kapsel mit zwei Klicks aktivieren, dann das Material ausdrücken (Abb. A-5). Die Verarbeitungszeit beträgt 1 Minute und 40 Sekunden ab Mischbeginn bei 23°C (73°F). Höhere Temperaturen verkürzen die Verarbeitungszeit.

- c) GC Fuji TRIAGE CAPSULE auf die Zahnoberfläche geben, und mit zweiten Schritt zu einer dünnen Schicht auf die Wurzeloberfläche und hypersensibilisierten Bereich oder die Fissuren verteilen (Abb. A-6). Hinweis:

- 1) Falls schnelleres Abbinden gewünscht wird, für 20-40 Sekunden eine Licht härteeinheit* verwenden. Die Lichtquelle so nahe wie möglich an die Zementoberfläche halten. Diese Methode funktioniert nur mit dem ROSA Material.

- 2) Die Kapsel mit zwei Klicks aktivieren, dann das Material ausdrücken (Abb. A-5). Die Verarbeitungszeit beträgt 1 Minute und 40 Sekunden ab Mischbeginn bei 23°C (73°F). Höhere Temperaturen verkürzen die Verarbeitungszeit.

- c) GC Fuji TRIAGE CAPSULE auf die Zahnoberfläche geben, und mit zweiten Schritt zu einer dünnen Schicht auf die Wurzeloberfläche und hypersensibilisierten Bereich oder die Fissuren verteilen (Abb. A-6). Hinweis:

- 1) Falls schnelleres Abbinden gewünscht wird, für 20-40 Sekunden eine Licht härteeinheit* verwenden. Die Lichtquelle so nahe wie möglich an die Zementoberfläche halten. Diese Methode funktioniert nur mit dem ROSA Material.

- 2) Die Kapsel mit zwei Klicks aktivieren, dann das Material ausdrücken (Abb. A-5). Die Verarbeitungszeit beträgt 1 Minute und 40 Sekunden ab Mischbeginn bei 23°C (73°F). Höhere Temperaturen verkürzen die Verarbeitungszeit.

- c) GC Fuji TRIAGE CAPSULE auf die Zahnoberfläche geben, und mit zweiten Schritt zu einer dünnen Schicht auf die Wurzeloberfläche und hypersensibilisierten Bereich oder die Fissuren verteilen (Abb. A-6). Hinweis:

- 1) Falls schnelleres Abbinden gewünscht wird, für 20-40 Sekunden eine Licht härteeinheit* verwenden. Die Lichtquelle so nahe wie möglich an die Zementoberfläche halten. Diese Methode funktioniert nur mit dem ROSA Material.

- 2) Die Kapsel mit zwei Klicks aktivieren, dann das Material ausdrücken (Abb. A-5). Die Verarbeitungszeit beträgt 1 Minute und 40 Sekunden ab Mischbeginn bei 23°C (73°F). Höhere Temperaturen verkürzen die Verarbeitungszeit.

- c) GC Fuji TRIAGE CAPSULE auf die Zahnoberfläche geben, und mit zweiten Schritt zu einer dünnen Schicht auf die Wurzeloberfläche und hypersensibilisierten Bereich oder die Fissuren verteilen (Abb. A-6). Hinweis:

- 1) Falls schnelleres Abbinden gewünscht wird, für 20-40 Sekunden eine Licht härteeinheit* verwenden. Die Lichtquelle so nahe wie möglich an die Zementoberfläche halten. Diese Methode funktioniert nur mit dem ROSA Material.

- 2) Die Kapsel mit zwei Klicks aktivieren, dann das Material ausdrücken (Abb. A-5). Die Verarbeitungszeit beträgt 1 Minute und 40 Sekunden ab Mischbeginn bei 23°C (73°F). Höhere Temperaturen verkürzen die Verarbeitungszeit.

- c) GC Fuji TRIAGE CAPSULE auf die Zahnoberfläche geben, und mit zweiten Schritt zu einer dünnen Schicht auf die Wurzeloberfläche und hypersensibilisierten Bereich oder die Fissuren verteilen (Abb. A-6). Hinweis:

- 1) Falls schnelleres Abbinden gewünscht wird, für 20-40 Sekunden eine Licht härteeinheit* verwenden. Die Lichtquelle so nahe wie möglich an die Zementoberfläche halten. Diese Methode funktioniert nur mit dem ROSA Material.

- 2) Die Kapsel mit zwei Klicks aktivieren, dann das Material ausdrücken (Abb. A-5). Die Verarbeitungszeit beträgt 1 Minute und 40 Sekunden ab Mischbeginn bei 23°C (73°F). Höhere Temperaturen verkürzen die Verarbeitungszeit.

- c) GC Fuji TRIAGE CAPSULE auf die Zahnoberfläche geben, und mit zweiten Schritt zu einer dünnen Schicht auf die Wurzeloberfläche und hypersensibilisierten Bereich oder die Fissuren verteilen (Abb. A-6). Hinweis:

- 1) Falls schnelleres Abbinden gewünscht wird, für 20-40 Sekunden eine Licht härteeinheit* verwenden. Die Lichtquelle so nahe wie möglich an die Zementoberfläche halten. Diese Methode funktioniert nur mit dem ROSA Material.

- 2) Die Kapsel mit zwei Klicks aktivieren, dann das Material ausdrücken (Abb. A-5). Die Verarbeitungszeit beträgt 1 Minute und 40 Sekunden ab Mischbeginn bei 23°C (73°F). Höhere Temperaturen verkürzen die Verarbeitungszeit.

- c) GC Fuji TRIAGE CAPSULE auf die Zahnoberfläche geben, und mit zweiten Schritt zu einer dünnen Schicht auf die Wurzeloberfläche und hypersensibilisierten Bereich oder die Fissuren verteilen (Abb. A-6). Hinweis:

- 1) Falls schnelleres Abbinden gewünscht wird, für 20-40 Sekunden eine Licht härteeinheit* verwenden. Die Lichtquelle so nahe wie möglich an die Zementoberfläche halten. Diese Methode funktioniert nur mit dem ROSA Material.

- 2) Die Kapsel mit zwei Klicks aktivieren, dann das Material ausdrücken (Abb. A-5). Die Verarbeitungszeit beträgt 1 Minute und 40 Sekunden ab Mischbeginn bei 23°C (73°F). Höhere Temperaturen verkürzen die Verarbeitungszeit.

- c) GC Fuji TRIAGE CAPSULE auf die Zahnoberfläche geben, und mit zweiten Schritt zu einer dünnen Schicht auf die Wurzeloberfläche und hypersensibilisierten Bereich oder die Fissuren verteilen (Abb. A-6). Hinweis:

- 1) Falls schnelleres Abbinden gewünscht wird, für 20-40 Sekunden eine Licht härteeinheit* verwenden. Die Lichtquelle so nahe wie möglich an die Zementoberfläche halten. Diese Methode funktioniert nur mit dem ROSA Material.

- 2) Die Kapsel mit zwei Klicks aktivieren, dann das Material ausdrücken (Abb. A-5). Die Verarbeitungszeit beträgt 1 Minute und 40 Sekunden ab Mischbeginn bei 23°C (73°F). Höhere Temperaturen verkürzen die Verarbeitungszeit.

- c) GC Fuji TRIAGE CAPSULE auf die Zahnoberfläche geben, und mit zweiten Schritt zu einer dünnen Schicht auf die Wurzeloberfläche und hypersensibilisierten Bereich oder die Fissuren verteilen (Abb. A-6). Hinweis:

- 1) Falls schnelleres Abbinden gewünscht wird, für 20-40 Sekunden eine Licht härteeinheit* verwenden. Die Lichtquelle so nahe wie möglich an die Zementoberfläche halten. Diese Methode funktioniert nur mit dem ROSA Material.

- 2) Die Kapsel mit zwei Klicks aktivieren, dann das Material ausdrücken (Abb. A-5). Die Verarbeitungszeit beträgt 1 Minute und 40 Sekunden ab Mischbeginn bei 23°C (73°F). Höhere Temperaturen verkürzen die Verarbeitungszeit.

- c) GC Fuji TRIAGE CAPSULE auf die Zahnoberfläche geben, und mit zweiten Schritt zu einer dünnen Schicht auf die Wurzeloberfläche und hypersensibilisierten Bereich oder die Fissuren verteilen (Abb. A-6). Hinweis:

- 1) Falls schnelleres Abbinden gewünscht wird, für 20-40 Sekunden eine Licht härteeinheit* verwenden. Die Lichtquelle so nahe wie möglich an die Zementoberfläche halten. Diese Methode funktioniert nur mit dem ROSA Material.

- 2) Die Kapsel mit zwei Klicks aktivieren, dann das Material ausdrücken (Abb. A-5). Die Verarbeitungszeit beträgt 1 Minute und 40 Sekunden ab Mischbeginn bei 23°C (73°F



GC Fuji TRIAGE™ CAPSULE

GLASJONOMER MED RØNTGENKONTRAST I KAPSLER TIL TEMPORÆRE FYLDNINGER OG SOM PREVENTIV TERAPI

Må kun bruges af uddannede tandlæger i de indicerede områder.

INDIKATIONER TIL ANVENDELSE

- Fissurforsøgning
- Rodoverflade beskyttelse.
- Forebyggelse samt kontrollere hypersensibilitet.
- Beskyttelse af emalje under dannelsen.
- Temporær forsegling af tænder som endodonti behandles.
- Temporære fyldninger.

KONTRAINDIKATIONER

- Direkte pulpaoverkærpning.
- Ungds bruget af dette produkt på patienter med kendt allergi overfor glasjonomeremcenter.

OPBYGNING

Pulver: Fluoraluminiumsilikatglas, pigment
Væske: Vand, polyakrylsyre, carboxylsyre

BRUGSANVISNING

Den rosa farve afbinder på kommando ved hjælp af lys, den hvide farve afbinder kun kemisk

Pulver / Væske forhold (g/g)	0,30 / 0,15
Blandetid (sek.)	10"
Arbejdstid (23°C/73°F) (min., sek.)	140"
Netto Afbindingstid (37°C/99°F) (min., sek.)	2'30"
Finishing og polering må tidligst begynde (37°C/99°F, fra start af blanding) (min., sek.)	8'00"
Finishing og polering må tidligst begynde såfremt lyshæderes (rosa kommand set) (37°C/99°F, fra start af blanding) (min.,sek.)	4'00"

ISO 9917-1 Glas polyalkenoatcement, Restaurering

A. FISSURBEKYTTELSE

BESKYTTELSE AF RODOVERFLADE
FOREBYGGE SAMT KONTROLLERE
HYPERSENSIBILITET

BESKYTTELSE AF EMALJE UNDER DANNEELSE

- Præparation af tænderens overflade (f.eks. til beskyttelse af fissurer og/eller rodoverflader)
- Efter rengøring af tænderens overflade (pimpsten og vand) på sædvanlig måde, spray omhyggeligt med vand. Undgå at irritere operculum.
Bemærk
Såfremt ekstra retention ønskes, så anbefales applicering af CAVITY CONDITIONER (10 sekunder) eller DENTIN CONDITIONER (20 sekunder). Conditioner skal skylles grundigt af efter applicering.
- Tørlæg med en bomuldsplet, alternativt forsigtigt med luftspøjten (Fig. A-1). DEHYDRER IKKE TÅNDEN. Bedste resultat er når de aktuelle overflader ses af øjet som let fugtige evt. glinsende.

- Inden kapslen aktiveres, skal dens side bankes med en hård overflade for at fjerne kapslens indhold af pulver (Fig. A-2).
- Aktiver kapslen ved at presse stemplet ind til det fugter med kapslens kant og hold den i 2 sek. (Fig. A-3).

- Vær sikker på at stemplet er presset helt ind for at undgå utilidskækkelig blanding af pulver og væske.
- Kapselhalv skal aktiveres umiddelbart inden blandingen, og indholdet skal anvendes umiddelbart efter.

- Kapslen fjernes hurtigst fra appliren og sættes i en kapselbeholder og trykkes i 10 sekunder (v/- 4.000 slag/minut) (Fig. A-4).

- Applirer.

- Aktiv kapsel fra kapselblenderen til kapselapplieren.

- Flyt kapslen fra kapselblenderen håndtag 2 gange for at gøre klar til applicering (Fig. A-5). Arbejdstiden er 1 minut og 40 sekunder fra start af blandingen ved 23°C (73°F).

- Højere temperaturer vil afkorte arbejdstiden.

- Applirer det blandede materiale på tandfladen (Fig. A-6). Anvend en pensel til at fordele GC Fuji TRIAGE CAPSULE Ud i et tyndt lag på rodoverflade, over det hypersensitive område eller på den okkulske flade samt fissurer.

- Ønskes en hurtigere afbindingstid, hold en lypolymeriseringslampe over materialet i 20-40 sekunder. Hold lyselederen så tæt på materialet som muligt. Den procedure er kun nødvendig ved den rosa farve. Efter lyshærdning anbefales det at beskytte overfladen med en vernish.

- For at justere vinklen på spidsen så skal kapslen drejes i GC CAPSULE APPLIER.

- For at fjerne kapslen fra GC Appliren, tryk på udløserknappen og træk herefter kapslen opad.

- Efter applicering, når materialet begynder at tage sin glans (eller efter lyshærdningen), der appliceres GC Fuji VARNISH (blås den tør) eller GC Fuji COAT LC (lyshærdning) på den forlørte glas (eller efter lyshærdning), applicer GC Fuji VARNISH (blås den tør) eller GC Fuji COAT LC (lyshærdning) for at forsegle området og beskytte grænsefladen. Anvend en bomulls- eller skummumpellet som luftspøjten (Fig. A-8).

- Finishing og pudning under vandspary kan udføres 6 minutter efter blandingstart (kemisk afbinding). Anvend efter 4 minutter såfremt materialet lyshæderes. Anvend en superfine diamant eller en finisheringspids (Fig. A-9).

- Applirer GC Fuji VARNISH eller GC Fuji COAT LC på de aktuelle flader igen (Fig. A-9).

- Temporære FORSEGLING AF TÆNDER SOM ENDODONTI BEHANDLES

- Rengøring af pulpakammeret

- Efter pulpabehandling, rengør og tørlæg forsigtigt pulpakammeret (Fig. B-1).

- Placer en bomuldsplet i kammeret (Fig. B-2).

- Se anvisningerne i A, sektion 2.

- Se anvisningerne i A, sektion 3, punkt a og b.

- Applirer det blandede materiale direkte overfor bomuldspletten (Fig. B-3).

- Se anvisningerne i A, sektion 3, d, e og f.

- Se anvisningerne i A, sektion 3, d, e og f.

- Se anvisningerne i A, sektion 3, d, e og f.

- Se anvisningerne i A, sektion 3, d, e og f.

- Se anvisningerne i A, sektion 3, d, e og f.

- Se anvisningerne i A, sektion 3, d, e og f.

- Se anvisningerne i A, sektion 3, d, e og f.

- Se anvisningerne i A, sektion 3, d, e og f.

- Se anvisningerne i A, sektion 3, d, e og f.

- Se anvisningerne i A, sektion 3, d, e og f.

- Se anvisningerne i A, sektion 3, d, e og f.

- Se anvisningerne i A, sektion 3, d, e og f.

- Se anvisningerne i A, sektion 3, d, e og f.

- Se anvisningerne i A, sektion 3, d, e og f.

- Se anvisningerne i A, sektion 3, d, e og f.

- Se anvisningerne i A, sektion 3, d, e og f.

- Se anvisningerne i A, sektion 3, d, e og f.

- Se anvisningerne i A, sektion 3, d, e og f.

- Se anvisningerne i A, sektion 3, d, e og f.

- Se anvisningerne i A, sektion 3, d, e og f.

- Se anvisningerne i A, sektion 3, d, e og f.

- Se anvisningerne i A, sektion 3, d, e og f.

- Se anvisningerne i A, sektion 3, d, e og f.

- Se anvisningerne i A, sektion 3, d, e og f.

- Se anvisningerne i A, sektion 3, d, e og f.

- Se anvisningerne i A, sektion 3, d, e og f.

- Se anvisningerne i A, sektion 3, d, e og f.

- Se anvisningerne i A, sektion 3, d, e og f.


- Se anvisningerne i A, sektion 3, d, e og f.

- Se anvisningerne i A, sektion 3, d, e og f.

- Se anvisningerne i A, sektion 3, d, e og f.

- Se anvisningerne i A, sektion 3, d, e og f.

- Se anvisningerne i A, sektion 3, d, e og f.



GC Fuji TRIAGE™ CAPSULE

RÖNTGENKONSTRERANDE GLASJONOMER I KAPSLAR FÖR TEMPORÄRA FYLLNINGAR OCH PREVENTIV TERAPI

Får endast användas av tandvårdspersonal enligt indikationerna för användning.

INDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING

- Fissurskydd.
- Rotfesydd.
- Forebyggande samt kontrollera hypersensibilitet.
- Beskyttelse av emalje under bildande.
- Skydd av emal under bildande.
- Temporär försegling av tänder som endodontibehandlas.
- Temporära fyllningar.

KONTRAINDIKATIONER

- Direkt pulpåpverkning.
- Undvik att använda denna produkt på patienter med känd allergi mot glasjonomeremcenter.

INNEHÅLL

Pulver: Fluoro-aluminium-silikatglas, pigment
Vätske: Vatten, polyakrylsyra, karboxylsyra

BRUKSANVISNING

Den rosa färgen stelnar på kommando med hjälp av ljus, den vita färgen stelnar enbart kemiskt.

Pulver / Vätska relation (g/g)	0,30 / 0,15
Blandningstid (sek.)	140"
Arbetsid (23°C/73°F) (min., sek.)	2'30"
Stelningsid, netto (37°C/99°F) (min., sek.)	140"
Slutlig finishering kan påbörjas efter lyshärdning (rosa kommando set) (37°C/99°F, från start av blanding) (min., sek.)	6'00"
Slutlig finishering kan påbörjas efter lyshärdning (rosa kommando set) (37°C/99°F, från start av blanding) (min., sek.)	4'00"

ISO 9917-1 Glaspolyalkenoatcement, Restaurering

A. FISSURBEKYDD

RÖTRESKYDD
FÖREBYGGA SAMT KONTROLLERA
HYPERSENSIBILITET

BESKYDD AV EMALJ UNDER BILNANDE

- Preparation av tandens yta (Tex för skydd av fissurer och/eller rotfesydd)
- Efter rengöring av tandens yta (profylax med pimpsten och vatten) på sedvanligt sätt, spraya omsorgsfullt med vatten. Undvik att irritera operculum.
OBS:
Om extra retension önskas rekommenderas att applicera CAVITY CONDITIONER (10 sekunder) eller DENTIN CONDITIONER (20 sekunder). Conditioner ska sköljas grundigt av efter applicering.
- Törslag med en bomullsplätt, alternativt försiktigt med luftspöjet (Fig. A-1). DEHYDRERA INTE TÅNDEN. Bäst resultat erhålls när de aktuella ytorna upptas som lätt fuktiga.

- Blandning

- Inden kapseln aktiveras, ska dess sida bankas med en hård yta för att fäsa kapselns innehåll av pulver (Fig. A-2).

- Aktiver kapseln genom att trycka in knappen så att den kommer i ett nära så jämt läge i förhållande till kapselkroppen, håll nere i 2 sekunder (Fig. A-3).

- Vär säker på att stemplet är pressat helt ind för att undgå utilidskækkelig blanding av pulver og væske.

- Kapselhalv skal aktiveres umiddelbart inden blandingen, og indholdet skal anvendes umiddelbart efter.

- Kapslen fjernes hurtigst fra appliren og sættes i en kapselbeholder og trykkes i 10 sekunder (v/- 4.000 slag/minut) (Fig. A-4).

- Applirer.

- Aktiv kapsel fra kapselblenderen til kapselapplieren.

- Flyt kapslen fra kapselblenderen håndtag 2 gange for at gøre klar til applicering (Fig. A-5). Arbejdstiden er 1 minut og 40 sekunder fra blandingens påbegyndelse ved 23°C (73°F).

- Højere temperaturer vil afkorte arbejdstiden.

- Applirer det blandede materiale på tandfladen (Fig. A-6). Anvend en pensel for at fordele GC Fuji TRIAGE CAPSULE Ud i et tyndt lag på rodoverflade, over det hypersensitive område eller på den okkulske flade samt fissurer.

- Ønskes en hurtigere afbindingstid, hold en lypolymeriseringslampe over materialet i 20-40 sekunder. Hold lyselederen så tæt på materialet som muligt. Den procedure er kun nødvendig ved den rosa farve. Efter lyshærdning anbefales det at beskytte overfladen med en vernish.

- For at justere vinklen på spidsen så skal kapslen drejes i GC CAPSULE APPLIER.

- For at fjerne kapslen fra GC Appliren, tryk på udløserknappen og træk herefter kapslen opad.

- Efter applicering, når materialet begynder at tage sin glans (eller efter lyshærdningen), der appliceres GC Fuji VARNISH (blås den tør) eller GC Fuji COAT LC (lyshærdning) på den forlørte glas (eller efter lyshærdning), applicer GC Fuji VARNISH (blås den tør) eller GC Fuji COAT LC (lyshærdning) for at forsegle området og beskytte grænsefladen. Anvend en bomulls- eller skummumpellet som luftspöjet (Fig. A-8).

- Finishing og pudning under vandspary kan udføres 6 minutter efter blandingstart (kemisk steling) eller efter 4 minutter ifald materialet lyshæderes. Anvend en superfine diamant eller en silikonfinisheringspids (Fig. A-9).

- Applirer GC Fuji VARNISH eller GC Fuji COAT LC på de aktuelle ytorna igen (Fig. A-9).

- Temporär FÖRSEGLING AV TÅNDER SOM ENDODONTI BEHANDLES

- Rengöring av pulpakammaren

- Efter pulpabehandling, rengör och torrlæg försiktigt pulpakammaren (Fig. B-1).

- Placera en bomullsplätt i kammaran (Fig. B-2).

- Se anvisningarna under A (ovan), sektion 2.

- Se anvisningarna under A, sektion 3, punkt a och b.

- Applirer det blandede materialet direkt ovanför bomullspletten (Fig. B-3).

- Se anvisningarna under A, sektion 3, d, e och f.

- Se anvisningarna under A, sektion 3, d, e och f.

- Se anvisningarna under A, sektion 3, d, e och f.

- Se anvisningarna under A, sektion 3, d, e och f.

- Se anvisningarna under A, sektion 3, d, e och f.

- Se anvisningarna under A, sektion 3, d, e och f.

- Se anvisningarna under A, sektion 3, d, e och f.

- Se anvisningarna under A, sektion 3, d, e och f.

- Se anvisningarna under A, sektion 3, d, e och f.

- Se anvisningarna under A, sektion 3, d, e och f.

- Se anvisningarna under A, sektion 3, d, e och f.

- Se anvisningarna under A, sektion 3, d, e och f.

- Se anvisningarna under A, sektion 3, d, e och f.

- Se anvisningarna under A, sektion 3, d, e och f.

- Se anvisningarna under A, sektion 3, d, e och f.

- Se anvisningarna under A, sektion 3, d, e och f.

- Se anvisningarna under A, sektion 3, d, e och f.

- Se anvisningarna under A, sektion 3, d, e och f.

- Se anvisningarna under A, sektion 3, d, e och f.

- Se anvisningarna under A, sektion 3, d, e och f.

- Se anvisningarna under A, sektion 3, d, e och f.

- Se anvisningarna under A, sektion 3, d, e och f.

- Se anvisningarna under A, sektion 3, d, e och f.

- Se anvisningarna under A, sektion 3, d, e och f.

- Se anvisningarna under A, sektion 3, d, e och f.


- Se anvisningarna under A, sektion 3, d, e och f.

- Se anvisningarna under A, sektion 3, d, e och f.

- Se anvisningarna under A, sektion 3, d, e och f.

- Se anvisningarna under A, sektion 3, d, e och f.

- Se anvisningarna under A, sektion 3, d, e och f.



GC Fuji TRIAGE™ CAPSULE

CIMENTO DE IONÓMERO DE VIDRO RADIOPAÇO PARA PROTEÇÃO E RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS EM CAPSULAS

Para utilização apenas por um profissional dentário nas indicações de sua utilização.

INDICAÇÕES

- Proteção de fissuras.
- Proteção da superfície radicular.
- Prevenção e controle da hipersensibilidade dentária.
- Proteção de esmalte imaturo.
- Restauração provisória do acesso coronário em endodontia.
- Restaurações provisórias

CONTRA-INDICAÇÕES

- Proteção pulpár direta.
- Evite utilizar este produto em dentes com alergias conhecidas ao cimento de ionômero de vidro.

COMPOSIÇÃO

Lq: Fluoroaluminossilicato de vidro, pigmento
Líquido: Água, ácido poliacrílico, ácido carboxílico

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Tonalidade ROSA permite polimerização controlada. Tonalidade BRANCA apenas polimerização química.

Proporção Pó / Líquido (g/g)	0,30 / 0,15
Tempo de mistura (seg.)	10"
Tempo de trabalho (23°C/73°F) (min., seg.)	140"
Tempo total de endurecimento (37°C/99°F) (min., seg.)	2'30"
Tempo de secagem dentro da cavidade oral (37°C/99°F, desde o início da mistura) (min., seg.)	6'00"
Tempo de secagem depois da cavidade oral com fotopolimerização (polimerização controlada ROSA) (37°C/99°F, desde o início da mistura) (min., seg.)	4'00"

ISO 9917-1 Cimento de polialcenoal de vidro, Restauração

A. PROTEÇÃO DAS FISSURAS

PROTEÇÃO DA SUPERFÍCIE RADICULAR
PREVENÇÃO E CONTROLE DA
HIPERSENSIBILIDADE DENTÁRIA

PROTEÇÃO DO ESMALTE IMATURO

- Preparação das superfícies do dente (p. ex. para a proteção de fissuras ou da superfície radicular)
- Depois de limpar as superfícies do dente (profilaxia com pasta de dente pomos e água) do modo habitual, lavar bem com água. Evitar agravar o opérculo.
Nota:
Se for desejável retenção adicional, recomenda-se a aplicação de CONDICIONADOR CAVITÁRIO (10 segundos) ou CONDICIONADOR DA DENTINA (20 segundos). O condicionador deve ser enxaguado completamente após a aplicação.
- Secar com uma bola de algodão ou com um jato suave da seringa de ar (Fig. A-1). NÃO SEQUE COMPLETAMENTE. Os melhores resultados obtêm-se quando as superfícies preparadas têm um aspecto húmido (brilhante).

- Mistura

- Antes de activar, agite a cápsula ou bata com o lado desta numa superfície dura, para soltar o pó (Fig. A-2).