



IFU FUJI IX GP CAPSULE
NW3705_30000635

EN

GC Fuji™ IX GP CAPSULE

RADIOAPAKE POSTERIOR GLASS IONOMER RESTORATIVE CEMENT IN CAPSULES

For use only by a dental professional in the indications for use.

INDICATIONS FOR USE

- Class I and II restorations in deciduous teeth.
- Non-load bearing Class I and Class II restorations in permanent teeth.
- Intermediate restorative and base material for heavy stress situation in Class I and Class II cavities using sandwich laminate technique.
- Class V and root surface restorations.
- Cone build-up.

CONTRAINDICATIONS

- Direct pulp capping.
- Avoid use of this product in patients with known allergies to glass ionomer cement.

COMPOSITION
Powder: Fluoro-alumino-silicate glass, polyacrylic acid, pigment
Liquid: Water, polyacrylic acid, carboxylic acid

DIRECTIONS FOR USE

Powder / Liquid Ratio(g/g)	0.40 / 0.11
Mixing Time (sec.)	10"
Time of initial extrusion after mixing	10 seconds maximum
Working Time (min., sec.)	2'00"
Net Setting Time (min., sec.)	22'20"
Final Finishing Commencing Time (37°C, after starting mix (min., sec.)	6'00"

Test conditions: Temperature (23 +/-1 °C), Relative humidity (50 +/-5%)

ISO 9917-1: Glass polyalkenoate cement, Restauration

- CAVITY PREPARATION**
Prepare tooth using standard techniques. Extensive mechanical retention is unnecessary. For OPS capping use calcium hydroxide.
b) Apply GC CAVITY CONDITIONER(10 seconds) or GC DENTIN CONDITIONER(20 seconds) to the bonding surfaces using a cotton pellet or sponge (Fig. 1).
- c) Rise thoroughly with water. Blot away excess material with a cotton pellet or dry by gently blowing with an air syringe. Do not DESICCATE. Prepared surfaces should appear moist(glistening).
- CAP SQUEEZING AND PLUNGERING**
a) Before activation, shake the capsule or tap it side on a hard surface to loosen the powder(Fig. 2).
b) To activate the capsule, push the plunger until it is fully depressed with the main body and hold it down for 2 seconds(Fig. 3).
- c) Ensure the plunger is fully pressed to avoid the incorrect mixing ratio of powder and liquid.
d) The capsule should be activated just before mixing and used immediately.
e) When using it set it into a rotator (an amalgamator) and mix for 10 seconds +/- 4,000 RPM(Fig. 4). Note: When using a rotational mixing device, it is recommended not to use the centrifuge option.

RESTORATIVE TECHNIQUE

- a) Immediately remove the mixed capsule from the mixer and lead it into the GC Capsule Applier.
b) Make two clicks to prime the capsule then syringe (Fig. 5). The working time is 2 minutes from start of mixing at 23°C(73.4°F). Higher temperatures shorten working time.
c) Within 10 seconds of maximum after mixing, start to extrude the mixture directly into the preparation (Fig. 6).
- d) Finish the preliminary contour, and cover with a matrix if required.
e) When set, immediately apply GC Fuji VARNISH (low-dry) or GC Fuji COAT LC(light cure)(Fig. 7). Note: To adjust the direction of the nozzle, hold the applicator with the capsule towards you and turn the capsule body.
f) To remove the use capsule, push the applicator upwards. Twist the capsule and spin the cap upwards.
- FINISHING**
a) Finishing using under spray using standard techniques can begin approximately 6 minutes after start of mixing(Fig. 8).
b) Apply a final coat of GC Fuji VARNISH(blow-dry) or GC Fuji COAT LC(light cure for 10 sec.) or GC-COAT PLUS(light cure for 30 sec.) (Fig. 9)
- c) Instruct the patient not to apply pressure for 1 hour.

STORAGE

Store in a cool and dark place (4-25°C/39.2-77.0°F).

SHADES

A2, A3, A3.5, B2, B3, C4

Shade numbers according to Vita® shade guide.

Shade is a registered trademark of Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germany

PACKAGES

- Single shade package: 50 capsules.
- Assortment package: 50 capsules (10 each of A2, A3, A3.5, B2, B3).
- Average contents per capsule: 0.40g powder and 0.11g(0.09mL) liquid. Minimum net volume of mixed cement per capsule: 0.14ml.

Option GC CAPSULE APPLIER(1 piece).

CAUTION

- In case of contact with oral tissue or skin, remove immediately with a sponge or cotton swab in alcohol. Flush with water.
- In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.

Personal protective equipment(PPE) such as gloves, face masks and safety eyewear should always be worn.

In rare cases the product may cause sensitivity in some people. If any such reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a physician.

Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous according to GHS.

EUDAMED database (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) or contact us at Regulatory.gsc@gc-dental

For the Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP) please see EUDAMED database (https://ec.europa.eu/tools/eudamed) or contact us at Regulatory.gsc@gc-dental

Undesired effects- Reporting: If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar event, please report it to us at this product, including those not listed in this instruction for use, please report them directly through the relevant vigilance system, by selecting the proper authority of your country accessible through the following link:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en as well as to our internal vigilance system:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

По този начин ще допринесете за подобряване на безопасността на този продукт.

Докладване на нежелани ефекти: Ако узнаете за какъвто и да е нежелан ефект, реакция или подобни събития, възникнали от употребата на този продукт, включително тези, които не са изброени в тази инструкция за употреба, моля, докладвайте ги директно чрез съответната система за безопасност, която избере подходящия орган във вашата страна достъпна чрез следната връзка:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en както и на нашата страница за вътрешна безопасност: vigilance@gc-dental

По този начин ще допринесете за подобряване на безопасността на този продукт.

Последна редакция : 04/2023



MANUFACTURED BY GC CORPORATION
5-1-1 Hattori, Shiohata-ku, Tokyo 174-8585, Japan

DISTRIBUTED BY GC CORPORATION
Hattori-cho, Shiohata-ku, Tokyo 174-8585, Japan

EU: GC EUROPE NV
Hattori-cho, Shiohata-ku, Tokyo 174-8585, Japan
Tel: +32 (0) 2 747 10 10

PRINTED IN BELGIUM

Пред употреба, внимателно прочетете инструкциите за употреба.

GC Fuji™ IX GP CAPSULE

RENTGENKONTRASTEN POSTERIOR GLASS-IONOMEREN VÛSTANTONNATELIEREN IN KAPSELN

Da se използва само от дентални лекари, спазвайки инструкциите за употреба.

ИНДИКАЦИИ ЗА УПОТРЕБА

- Възстановяване клас I и II на временни зъби.
- Възстановяване клас I и II дълбоко натоварване, при постоянни зъби.
- Междино възстановяване и основа за сандвич техника при I и II клас кавитети, подложки на полимо наваряване.
- Възстановяване V клас и дефекти по кореновата повърхност.
- Играещия на тънчета.

КОНТРАИДИКАЦИИ

- Директно пълно покритие.
- Не използвайте при пациенти с установени алергии към глас ионмери цемент.

СЪСТАВ

Прах: Флуор-алумино-силикатно стъкло, полиакрилова киселина, пигмент

Течност: Вода, полиакрилова киселина, карбоксилсва киселина

НАСОМЪК ЗА УПОТРЕБА

Прашк / течинаа помър (g/g)	0.40/0.11
Време за смесване (сек.)	10"
Съотношение прах / течност (g/g)	0.40/0.11
Смесиране на смесване (сек.)	10"
Време за начало нанасяне след смесване	10 секунди максимум
Време за работа (мин., сек.)	2'00"
Време за втвърдяване (мин., сек.)	22'20"
Начало на окончателното фиране (37°C, след началото на смесването) (мин., сек.)	6'00"

ISO 9917-1: Glass polyalkenoate cement, Възстановяване

- ПОДГОТОВКА НА КАВИТЕТА**
a) Препарирате зъба, използвайки стандартни техники. Разширяване механична ретенция не е необходимо. За покряване на пупата използвайте калций хидроксид.
b) Нанесете GC CAVITY CONDITIONER (10 секунди) или GC DENTIN CONDITIONER (20 секунди) върху подлежащите на свързване повърхности, използвайки памучен турунд или гъбичка (Фиг. 1).
- c) Промийте обилно с вода. Отстранете излишната вода, втривайте с памучен турунд или с лека въздушна струя. НЕ ПРЕСУШАВАЙТЕ. Подготвените повърхности трябва да изглеждат влажни (блестящи).
- АКТИВИРАНЕ НА КАПСУЛИТЕ И СМЕСАВАНЕ**
a) Преди да активирате, разклатете капсулата или я разклатете в чаша, за да се разклати и разпръснати (Фиг. 2).
- b) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- c) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- d) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- e) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- f) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- g) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- h) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- i) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- j) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- k) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- l) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- m) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- n) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- o) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- p) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- q) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- r) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- s) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- t) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- u) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- v) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- w) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- x) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- y) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- z) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- aa) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- ab) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- ac) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- ad) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- ae) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- af) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- ag) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- ah) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- ai) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- aj) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- ak) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- al) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- am) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- an) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- ao) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- ap) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- aq) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- ar) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- as) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- at) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- au) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- av) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- aw) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- ax) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- ay) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- az) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- ba) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- bb) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- bc) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- bd) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- be) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- bf) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- bg) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- bh) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- bi) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- bj) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- bk) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- bl) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- bm) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- bn) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- bo) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- bp) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- bq) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- br) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- bs) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- bt) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- bu) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- bv) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- bw) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- bx) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- by) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- bz) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- ca) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- cb) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- cc) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- cd) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- ce) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- cf) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- cg) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- ch) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- ci) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- cj) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- ck) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- cl) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- cm) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- cn) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- co) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- cp) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- cq) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- cr) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- cs) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- ct) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- cu) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- cv) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- cw) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- cx) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- cy) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- cz) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- ca) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- cb) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- cc) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- cd) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- ce) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- cf) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- cg) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- ch) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- ci) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- cj) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- ck) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- cl) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- cm) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- cn) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- co) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- cp) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- cq) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- cr) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- cs) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- ct) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- cu) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- cv) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- cw) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- cx) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- cy) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- cz) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- ca) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- cb) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- cc) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- cd) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- ce) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- cf) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- cg) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- ch) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- ci) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- cj) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- ck) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- cl) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- cm) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- cn) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- co) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- cp) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- cq) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- cr) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- cs) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- ct) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- cu) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- cv) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- cw) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- cx) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- cy) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- cz) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- ca) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- cb) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- cc) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- cd) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- ce) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- cf) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон до упор и държете го в тази позиция за 2 секунди (Фиг. 3).
- cg) За да активирате капсулата, натиснете спускателния бутон

Пред použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie.

SK

GC Fuji™ IX GP CAPSULE

RADIOOPÁKNY SKLOIONOMERNÝ VÝPLŇOVÝ MATERIÁL V KAPSUĽÁCH PRE VÝPLNE V LATERÁLNOJ ÚSEKU

Na použitie len zubným lekárom v indikáciách na použitie.

INDIKÁCIE PRE POUŽITIE

- Výplne I a II triedy v dočasnom chrúpe.
- Nie pri rube začiatku výplne I a II triedy v stálom chrúpe.
- Dočasné výplne a báze pre sňato zafarbené výplne I a II triedy za použitia sendvičovej techniky.
- Výplne v trvalých a dočasných lemiach, vrátane lemnutého spoju napo restaurácijske.
- Dostavby.

KONTRAINDIKÁCIE

- Príame prekrytie pulpy.
- Tento výrobok nepoužívajte u pacientov s preukázanou alergiou na skloionomerný cement.

ZLOŽENIE

Prášok: Fluor-hidro-nitro-silikátne sklo, kyselina polyakrylová, pigment
Tekutina: Voda, kyselina polyakrylová, kyselina karboxylová

NÁVOD NA POUŽITIE

Prášok / tekutina pomer (g/g)	0,40/0,11
Miešací čas (sek.)	10"
čas do začiatku vytlačenia materiálu od premiešania	maximálne 1 O sekúnd
Pracovný čas (min., sek.)	2'00"
Čistý čas tuhnutia (min., sek.)	2'20"
Začiatok konečného opracovania (37° C, po začatí miešania) (min., sek.)	6'00"

Testovacie podmienky: Teplota (23±/ -1 °C),

Relatívna vlhkosť (50±/ -5%)

ISO 9917-1 Sklo polyakionomerný cement, Výplň

- PRÍPRAVA KAVITY**
a) Zub pripravte pomocou štandardných techník. Nie je nutné rozširvať mechanickú retenciu. Na prekrytie pulpy použite hydroxid vápenatý.
b) Naneste GC CAVITY CONDITIONER (10 sekúnd) alebo GC DENTIN CONDITIONER (20 sekúnd) na vyznačenú povrchovú s pomocou vatnej kroglice alebo gôbice (Silka 1).
c) Môžno spieňať z vody. Osušite s pomocou vatnej kroglice ani nežno špičkou z zrakom [š]. Je pripravená povrchová. NE ZUSUŠUJTE. Rezultát so náložou, čo je pripravená povrchová (svetlosilka).
- AKTIVÁCIA KAPSUĽY A MIEŠANIE**
a) Pri aktivácii kapsule zatriasajte alebo s frou klenpíte o tvrdý povrch, aby sa uvoľnil prášok (obr. 2).
b) Kapsuľu aktivujte úplným zatriasnutím piesta do hlavného telesá kapsule a podržte ho 2 sekundy (obr. 2).
c) Poznámka:
1) Skontrolujte, či je piest úplne zatlačný, aby sa zabránilo neprávnemu zmiešaniu prášku s tekutinou.
2) Kapsuľu aktivujte tesne pred miešaním a potom okamžite použite.
c) Ihneď ihneď vložte doba zatriasnutia (4+4000 otáčok za minútu) miešajte po dobu 10 sekúnd (obr. 4).
Poznámka:
Ak používate rotačný zmiešavací prístroj, nepoužívajte možnosť centrifúgy
- TECHNICA VÝPLNE**
a) Zmiešajú kapsuľu okamžite vmieste z miešacieho prístroja a vložte do aplikátora GC Capsule Applier.
b) Dvakrát stlačte, potom je materiál v kapsuľu pripravený na aplikáciu (obr. 5). Pracovný čas je 1 minúty od začiatku miešania a pri teplote 23° C (73,4° F). Vyššia teplota skracuje pracovný čas.
c) Pri prebiehaní miešania 10 sekúnd od premiešania začiatku a vytlačenie materiálu priamo do pripravenej kavity (obr. 6).
d) Vyčistite oboje a pokiaľ je potreba umiestnite maticu.
e) Ihneď po zblutnutí nanesť GC Fuji VARNISH (osušte prúdom vzduchu) alebo GC Fuji COAT LG (vytvrdte svetlom) (obr. 7).
Poznámka:
1) Smer trysky nastavte tak, že aplikátor s kapsuľou pridržte smerom k sčie a odčiate telom kapsle.
2) Použite kapsuľu vyberiete stlačením uvoľňovacieho tlačidla na aplikátore. Kapsuľu odočte a vyhladiť smerom nahor.
- KONEČNÁ ÚPRAVA**
a) S konečnou úpravou pod vodným sprejom s pomocou štandardných techník môžete začať približne po 6 minútach od začiatku miešania (obr. 8).
b) Naneste finálnu vrstvu GC Fuji VARNISH (osušte prúdom vzduchu) alebo GC Fuji COAT LG (vytvrdte svetlom po dobu 10 sek.) alebo GC-COAT PLUS (vytvrdte svetlom po dobu 20 sek.) (obr. 9).
c) Upozornite pacienta, aby 1 hodinu nevyvíjal tlak na ošetrované miesto.

USKLADNENIE

Pre zachovanie optimálnych vlastností, skladujte na chladnom a tmavom mieste (4 - 25° C / 39,2 - 77,0° F).

ODTIENIE

A2, A3, A3.5, B2, B3, C4
Orál odtieň podľa vzorníka Vita®
Výber je podporovaný dohodou značka spoločnosti Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Nemásko.

BALENIE

- Balenie s jedným odtieňom: 50 kapsulí.
- Výberové balenie: 50 kapsulí (po 10 kusoch z A2, A3, A3.5, B2, B3). Príklady obalov kapsulí: 0,40 g prášku a 0,11 g (0,09 mL) tekutiny. Minimálny objem zmiešaného cementu v jednej kapsli: 1,14 ml.

UPOZORNENIE

- Ak dôjde ku styku prípravku s ústnou dutinou alebo s pokožkou, okamžite ho odstráňte prípravkom alebo vodou navlhčenou leňou. Odčistite vodou.
- Ak by došlo ku styku prípravku s očami, okamžite vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
- Vždy použite ochranné pomôcky ako rukavice, rúška a ochranný kryt očí.
- V ošetrovaných prípadoch môže výrobok spôsobiť citlivosť u ošetrovaných osôb. Ak sa vyskytnie takáto reakcia, prerušte používanie výrobku a vyhľadajte lekára.

Niektoré výrobky uvádzané v tomto návode na použitie, môžu byť klasifikované ako nebezpečné podľa GHS. Vždy sa obozrňte s bezpečnostnými listami, ktoré sú k dispozícii na stránkach: <http://www.georgroup.com> alebo pre Ameriku <http://www.gamceria.com>

Môžete ich tiež zistiť od svojho dodávateľa.
Súhrn bezpečnosti a klinického výkonu (SSCP) nájdete v databáze EUDAMED (<https://ec.europa.eu/tools/eudamed>) alebo nas kontaktujte na adrese Regulatory.gsc@ge-dental

Hlásenie nežiadúcich účinkov:
Ak sa Vám vyskytnú akékoľvek nežiaduce účinky, reakcie alebo podobné udalosti, pri používaní tohto výrobku vrátane tých, ktoré nie sú uvedené v tomto návode na použitie, oznámte ich priamo cez príslušný vigilance systém, zadanim správnej autority Vašej krajiny, na nasledujúcom linku: https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en ako aj na našom vlnutom systéme hlásení: vigilance@ge-dental

Týmto spôsobom prispievate k zvýšeniu bezpečnosti tohto výrobku.

Naposledy upravené : 04/2023

GC Fuji™ IX GP CAPSULE

RADIOOPÁČNI POSTERIORNI STEKLAČNO IONOMERNI RESTAVRATIVNI CEMENT V OBLIKU KAPSUĽ

Uporaba samo za profesionalne namene in za priporočene indikacije.

INDIKACIJE ZA UPORABO

- Restavracije I a II trieda pri miešnih zobeh
- Nie pri rube začiatku výplne I a II triedy v stálom chrúpe.
- Vmiesť restavracij v bazni material pri restavraciji I in II trieda, ki so močno obremenjene kot del sendvič tehnike.
- Restavracije v sredstvi in na koreninskih površinah.
- Izgradnja jedra

KONTRAINDIKACIJE

- Direktno prekrivanje pulpe
- Izognite se uporabi tega proizvoda pri pacientih z znano alergijo na skloionomerni cemente.

SESTAVA

Prášok: Fluor-aluminijsko-silikatno steklo, poliakrilna kislina, barvilo
Tekočina: voda, poliakrilna kislina, karboksilna kislina

NAVODILO ZA UPORABO

Razmerje prah / tekočina (g/g)	0,40/0,11
Čas mešanja (sek.)	10"
Čas začetenje ekstruzije po mešanju	Maksimalno 10 sekund
Delovni čas (min., sek.)	2'00"
Neto vreme stvrdjevanja (min., sek.)	2'20"
Prilobek čas za obdelovanje (37°C, ko se restavracija strdi) (min., sek.)	6'00"

Testni pogoji: temperatura (23± / -1 °C),

relativna vlažnost (50± / -5%)

ISO 9917-1 Stakleni poliakionomerni cement, Restavracija

- PRIPRAVA KAVITETE**
a) Zub pripravite s pomočjo običajnih tehnik. Obsežna mehanska retencija ni potrebna. Za zaščito pulpe uporabite kalcijev hidroksid.
b) Naneste GC CAVITY CONDITIONER (10 sekúnd) ali GC DENTIN CONDITIONER (20 sekúnd) na vyznačen površine s pomočjo vatne kroglice alebo gôbice (Silka 1).
c) Môžno spieňať z vody. Osušite s pomočjo vatne kroglice ani nežno špičkou z zrakom [š]. Če je pripravená površina. NE ZSUŠUJTE. Rezultát so náložou, čo je pripravená površina (svetlosilka).
- AKTIVIRANJE KAPSUĽE I MIEŠANJE**
a) Pri aktivácii kapsule kľp potpuno utisnuti v telo kapsule i držati utisnuto 2 sekunde (Silka 3).
b) Dvakrát stlačte, aby sa uvoľnil prášok (obr. 2).
c) Poznámka:
1) Skontrolujte, či je piest úplne zatlačný, aby sa zabránilo nepravilnému razmerju prahu v tekočine.
2) Kapsuľu mora byť aktivovaná tik pred miešaním in porabljanje takoj.
c) Ako tak vložite v miešaleček (ali amalgamator) na miešanie 10 sekúnd (+/- 4.000 obrátov)(Silka 4).
Navodilo:
e) Uporabte rotačný miešavací zmes, uporaba centrifuge ni priporočila.
- TECHNICA RESTAVIRANJA**
a) Zmiešajú kapsuľu odmah izvaditi iz miksera i postaviti je u aplikator GC Capsule Applier.
b) Kapsuľu aktiviraj sa dva kľdžacaj (Silka 5). Radno vreme iznos 2 min u GC Capsule Applier.
c) Nastavite dva kľdž, da pripravite kapsuľu (Silka 5). Delovni čas je 2 minuti od početka mešanja pri 23° C (73,4° F). Vise temperature skracuju radno vreme.
d) Unutar maksimalno 10 sekundi po mešanju potpuno istaknuti mešavinu direktno u preparaciju (Silka 6).
e) Grubo oblikovajte te po potrebi postaviť maticu.
f) Nakon stvrdjevanja odmah naneti GC Fuji VARNISH (sušiti vazduhom) ili GC Fuji COAT LG (svetlino obasvetliti) (Silka 7).
g) Ko se strdi takoj naneste GC Fuji VARNISH (osušiti pruzom vazduha) ili GC Fuji COAT LG (svetlino obasvetliti) (Silka 7).
Navodilo:
1) Za prolagođevanje usla likaju pridržite nastavak s kapsuľu protiv vama i držite telo kapsule.
2) Za odstranjenje upravljenke kapsule pritisnite na gumu za sprostitelj. Kapsuľu zavrtite in u položaje nazvanu obr. 4.
- KONČNA OBRADA**
a) S konečnim obdelovanjem pod vodnim sprejem uvoľňovacieho tlačidla na aplikátore približne 6 minut po začiatku miešania (Silka 8).
b) Naneste konečný lak GC Fuji VARNISH (osušite svetlom po dobu 10 sek.) alebo GC-COAT PLUS (osušite svetlom po dobu 20 sek.) (obr. 9).
c) Pacienta upozornite, aby 1 h po miešaní ne vyvíjal tlak na ošetrované miesto.

SHRANJEVANJE

Za zachovanie optimálnosti je priporočeno shranjevanie v hladnom i temnom prostoru (4 - 25° C / 39,2 - 77,0° F).

BARVE

A2, A3, A3.5, B2, B3, C4
Barve usližežaj Vita® barvnemu kľdžu.

Výber je podporovaný dohodou značka spoločnosti Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Nemásko.

PAKIRANJE

- Paket enee barve: 50 kapsulí.
- Asortiment: 50 kapsulí (10 kosov z A2, A3, A3.5, B2, B3). Povprečna vsebina kapsule: 0,40g práhu i 0,11g (0,09mL) tekočine. Minimalni neto volumen zmiešanego cementa po kapsuli: 0,14 ml.

Moznost: GC CAPSULE APPLIER (1 komad).

OPOROZLOJE

- V primeru stika materiala s tkiv i vstni votlini ali s kožo, ga takoj odstranite z gobo ali vato namočenou i alkohol. Dobro ispirajte vodo.
- Nu štetiti kapljici s očmi, takoj spienje z vodo i poistite pomoč zdravniku.
- Obvezna varovalna oprema kot so rukavice, obrazna maska i zaščitna očala se mora vedno uporabljati.
- V redkih primerih lahko izdelek pri nekaterih ljudeh povzroči preobčutljivost. V takem primeru prekinite z uporabo izdelka in napotite paciento k zdravniku.

Nekateri proizvodi omejenji v predhodnih navodilih za uporabo so lahko klasifikirani kao opasni prema GHS. Vždy se obozrňte u sigurnosno tehničkom listu na: <http://www.georgroup.com> ali za Ameriku <http://www.gamceria.com>
Takode su dostupni kod vašeg dobavljača.

Za rezime sigurnosti i kliničkog učinka (Summary of Safety and Clinical Performance - SSP) pogledajte bazu podataka EUDAMED (<https://ec.europa.eu/tools/eudamed>) ili nas kontaktirajte na Regulatory.gsc@ge-dental

Obaveštavanje o neželjenim dejstvima: Ako postanete svesni bilo kakvih neželjenih dejstava, reakcija ili sličnih događaja do kojih je došlo upotrebom ovog proizvoda, uključujući i one koji nisu navedeni u ovom uputstvu za upotrebu, molimo da ih prijavite direktno kroz odgovarajuć sistem nadzora, odabirom odgovarajućeg autouteta u veći drži zdravci.

Način izveštavanja ovdje proizvod može izazvati osjetljivost kod nekih osoba. U slučaju takve reakcije treba prekinuti sa upotrebom proizvoda i obratiti se lekaru.

Nekateri proizvodi omejenji v predhodnih navodilih za uporabo so lahko klasifikirani kao opasni prema GHS. Vždy se obozrňte u sigurnosno tehničkom listu na: <http://www.georgroup.com>

Takode su dostupni kod vašeg dobavljača.

Za rezime sigurnosti i kliničkog učinka (Summary of Safety and Clinical Performance - SSP) pogledajte bazu podataka EUDAMED (<https://ec.europa.eu/tools/eudamed>) ili nas kontaktirajte na Regulatory.gsc@ge-dental

Obaveštavanje o neželjenim dejstvima: Ako postanete svesni bilo kakvih neželjenih dejstava, reakcija ili sličnih događaja do kojih je došlo upotrebom ovog proizvoda, uključujući i one koji nisu navedeni u ovom uputstvu za upotrebu, molimo da ih prijavite direktno kroz odgovarajuć sistem nadzora, odabirom odgovarajućeg autouteta u veći drži zdravci.

Način izveštavanja ovdje proizvod može izazvati osjetljivost kod nekih osoba. U slučaju takve reakcije treba prekinuti sa upotrebom proizvoda i obratiti se lekaru.

Nekateri proizvodi omejenji v predhodnih navodilih za uporabo so lahko klasifikirani kao opasni prema GHS. Vždy se obozrňte u sigurnosno tehničkom listu na: <http://www.georgroup.com>

Takode su dostupni kod vašeg dobavljača.

Za rezime sigurnosti i kliničkog učinka (Summary of Safety and Clinical Performance - SSP) pogledajte bazu podataka EUDAMED (<https://ec.europa.eu/tools/eudamed>) ili nas kontaktirajte na Regulatory.gsc@ge-dental

Obaveštavanje o neželjenim dejstvima: Ako postanete svesni bilo kakvih neželjenih dejstava, reakcija ili sličnih događaja do kojih je došlo upotrebom ovog proizvoda, uključujući i one koji nisu navedeni u ovom uputstvu za upotrebu, molimo da ih prijavite direktno kroz odgovarajuć sistem nadzora, odabirom odgovarajućeg autouteta u veći drži zdravci.

Način izveštavanja ovdje proizvod može izazvati osjetljivost kod nekih osoba. U slučaju takve reakcije treba prekinuti sa upotrebom proizvoda i obratiti se lekaru.

Nekateri proizvodi omejenji v predhodnih navodilih za uporabo so lahko klasifikirani kao opasni prema GHS. Vždy se obozrňte u sigurnosno tehničkom listu na: <http://www.georgroup.com>

Takode su dostupni kod vašeg dobavljača.

Za rezime sigurnosti i kliničkog učinka (Summary of Safety and Clinical Performance - SSP) pogledajte bazu podataka EUDAMED (<https://ec.europa.eu/tools/eudamed>) ili nas kontaktirajte na Regulatory.gsc@ge-dental

Obaveštavanje o neželjenim dejstvima: Ako postanete svesni bilo kakvih neželjenih dejstava, reakcija ili sličnih događaja do kojih je došlo upotrebom ovog proizvoda, uključujući i one koji nisu navedeni u ovom uputstvu za upotrebu, molimo da ih prijavite direktno kroz odgovarajuć sistem nadzora, odabirom odgovarajućeg autouteta u veći drži zdravci.

Način izveštavanja ovdje proizvod može izazvati osjetljivost kod nekih osoba. U slučaju takve reakcije treba prekinuti sa upotrebom proizvoda i obratiti se lekaru.

GC Fuji™ IX GP CAPSULE

RENDGENSKI VIDLJIV GLASJONOMER CEMENT ZA ZADNJE ISPUNE U KAPSUĽAMA

Samo za stomačološko upotrebu i indikacijama za upotrebu.

INDIKACIJE ZA UPOTREBU

- Ispuni klase I i II miešnih zuba.
- Doim dieljenja výplne I a II triedy v stálom chrúpe, ktoré nie nose opterimentu.
- Direktní materialy za ispu i podlogu za kavitete klase I i II pod visokim opterimentem kot višestopie sendvič tehnike.
- Ispuni klase I i II površine korena.
- Nadogradnje.

KONTRAINDIKACIJE

- Direktno prekrivanje pulpe
- Izbežavati upotrebu ovog proizvoda kod pacijenata sa poznatom alergijom na glasonomerni cemente.

SASTAV

Prášok: Fluoro-alumino-silikatno sklo, poliakrilna kiselina, pigment
Tečnost: voda, poliakrilna kiselina, karboksilna kiselina

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Odnos prah / tečnost (g/g)	0,40/0,11
Vreme mešanja (sek.)	10"
Vreme početka istiskivanja nakon mešanja	maksimalno 10 sekundi
Radno vreme (min., sek.)	2'00"
Neto vreme stvrdnjevanja (min., sek.)	2'20"
Vreme početka završne obrade (37°C, nakon početka mešanja) (min., sek.)	6'00"

Uslovi testiranja: temperatura (23± / -1 °C)

Relativna vlažnost (50± / -5%)

ISO 9917-1 Stakleni poliakionomerni cement, Restavracija

- PRIPRAVA KAVITETA**
a) Zub preparirati na uobičajen način. Veća mehanička retencija nije potrebna. Za prekrivanje pulpe koristiti kalcijum-hidroksid.
b) Komadom čvrst ili sunderom naneti na površine sa spojanja GC CAVITY CONDITIONER (10 sek.) ili GC DENTIN CONDITIONER (20 sek.) (silka 1).
c) Dobro ispirati vodom. Osušiti komadom čvrst ili laganim nlažom puštera. NE PRESUŠITI. Najbolji rezultat postiću se ako su preparirane površine još vlažne (siju se).
- AKTIVIRANJE KAPSUĽE I MIEŠANJE**
a) Pre aktiviranja, protešiti ih jednom stranom udariti o tvrdi površinu, da se oslobodi prah (silka 2).
b) Aktiviranje kapsule klp potpuno utisnuti u telo kapsule i držati utisnuto 2 sekunde (silka 3).
c) Poznati:
1) Održavati da je klp potpuno utisnut da se izbegne nepravilan odnos mešanja praha i tečnosti.
2) Kapsulu treba aktivirati tek neposredno pre mešanja i odmah koristiti.
c) Kapsulu odmah postaviti u mikser (ili amalgamator) na miešanje 10 sekundi (+/- 4.000 obrtaja u minuti) (silka 4).
d) Ako se koristi rotacioni uređaj za mešanje preporučuje se da se ne koristi centrifuga
- TEHNIKA IZDAJE ISPUNA**
a) Zamešavaju kapsulu odmah izvaditi iz miksera i postaviti je u aplikator GC Capsule Applier.
b) Kapsulu aktiviraj sa dva kľdžacaj (Silka 5). Radno vreme iznos 2 min u GC Capsule Applier.
c) Nastavite dva kľdž, da pripravite kapsuľu (Silka 5). Delovni čas je 2 minuti od početka mešanja pri 23° C (73,4° F). Vise temperature skracuju radno vreme.
d) Unutar maksimalno 10 sekundi po mešanju potpuno istaknuti mešavinu direktno u preparaciju (Silka 6).
e) Grubo oblikovati te po potrebi postaviti maticu.
f) Nakon stvrdjevanja odmah naneti GC Fuji VARNISH (sušiti vazduhom) ili GC Fuji COAT LG (svetlino obasvetliti) (Silka 7).
g) Ko se strdi takoj naneti GC Fuji VARNISH (osušiti pruzom vazduha) ili GC Fuji COAT LG (svetlino obasvetliti) (Silka 7).
Navodilo:
1) Za namještanje smeru vaha, aplikator sa kapsulom držati prema sebi i okrenuti telo kapsule.
2) Za stvrdjevanje korišćenje kapsule pritisnuti dugme za oslobađanje na aplikatoru. Okrenuti kapsulu i povući prema gore.
- ZAVRŠNA OBRADA**
a) Završna obrada standardnim tehnikama pod vodenim mlazom može započeti oko 6 minuta posle od početka mešanja (Silka 8).
b) Postaviti završni premaz s GC Fuji VARNISH (sušiti vazduhom) ili GC Fuji COAT LG (svetlino obasvetliti) (Silka 9).
c) Pacijenta uputiti da ispu ne opterećuje prilikom završetka.

ČUVANJE

Za optimalni rad preporučuje se čuvanje na hladnom i tamnom mestu (4 - 25° C).

BOJE

A2, A3, A3.5, B2, B3, C4
Bojeji boja prema Vita® vodiču za boje.

Výber je podporovaný dohodou značka spoločnosti Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Nemásko.

PAKOVANJE

- Pakovanje sa jednom bojom: 50 kapsula.
- Odabano pakovanje: 50 kapsula (po 10 komada bojeA2, A3, A3.5, B2, B3). Povprečna vsebina kapsule: 0,40g práhu i 0,11g (0,09 ml) tečnosti. Minimalni neto volumen zmiešanego cementa po kapsuli: 0,14 ml.

Moznost: GC CAPSULE APPLIER (1 komad).

UPOZORENJE

- U slučaju dodira sa oralnim tkivima ili kožom, odmah odstraniti vatnom ili sunderom namočenom u alkohol. Dobro ispirati vodom.
- Ne ulaziti kapljici s očima, odmah ispirati vodom i potražiti lekara.
- Obavezna varovalna oprema, kao što su rukavice, maske za lice i sigurnosna zaštitna za lice, treba uvek nositi.
- U retkim slučajevima ovaj proizvod može izazvati osjetljivost kod nekih osoba. U slučaju takve reakcije treba prekinuti sa upotrebom proizvoda i obratiti se lekaru.

Nekateri proizvodi omejenji v predhodnih navodilih za uporabo su lahko klasifikirani kao opasni prema GHS. Vždy se obozrňte u sigurnosno tehničkom listu na: <http://www.georgroup.com> ali za Ameriku <http://www.gamceria.com>
Takode su dostupni kod vašeg dobavljača.

Za rezime sigurnosti i kliničkog učinka (Summary of Safety and Clinical Performance - SSP) pogledajte bazu podataka EUDAMED (<https://ec.europa.eu/tools/eudamed>) ili nas kontaktirajte na Regulatory.gsc@ge-dental

Obaveštavanje o neželjenim dejstvima: Ako postanete svesni bilo kakvih neželjenih dejstava, reakcija ili sličnih događaja do kojih je došlo upotrebom ovog proizvoda, uključujući i one koji nisu navedeni u ovom uputstvu za upotrebu, molimo da ih prijavite direktno kroz odgovarajuć sistem nadzora, odabirom odgovarajućeg autouteta u veći drži zdravci.

Način izveštavanja ovdje proizvod može izazvati osjetljivost kod nekih osoba. U slučaju takve reakcije treba prekinuti sa upotrebom proizvoda i obratiti se lekaru.

Nekateri proizvodi omejenji v predhodnih navodilih za uporabo su lahko klasifikirani kao opasni prema GHS. Vždy se obozrňte u sigurnosno tehničkom listu na: <http://www.georgroup.com>

Takode su dostupni kod vašeg dobavljača.

Za rezime sigurnosti i kliničkog učinka (Summary of Safety and Clinical Performance - SSP) pogledajte bazu podataka EUDAMED (<https://ec.europa.eu/tools/eudamed>) ili nas kontaktirajte na Regulatory.gsc@ge-dental

Obaveštavanje o neželjenim dejstvima: Ako postanete svesni bilo kakvih neželjenih dejstava, reakcija ili sličnih događaja do kojih je došlo upotrebom ovog proizvoda, uključujući i one koji nisu navedeni u ovom uputstvu za upotrebu, molimo da ih prijavite direktno kroz odgovarajuć sistem nadzora, odabirom odgovarajućeg autouteta u veći drži zdravci.

Način izveštavanja ovdje proizvod može izazvati osjetljivost kod nekih osoba. U slučaju takve reakcije treba prekinuti sa upotrebom proizvoda i obratiti se lekaru.

Nekateri proizvodi omejenji v predhodnih navodilih za uporabo su lahko klasifikirani kao opasni prema GHS. Vždy se obozrňte u sigurnosno tehničkom listu na: <http://www.georgroup.com>

Takode su dostupni kod vašeg dobavljača.

Za rezime sigurnosti i kliničkog učinka (Summary of Safety and Clinical Performance - SSP) pogledajte bazu podataka EUDAMED (<https://ec.europa.eu/tools/eudamed>) ili nas kontaktirajte na Regulatory.gsc@ge-dental

Obaveštavanje o neželjenim dejstvima: Ako postanete svesni bilo kakvih neželjenih dejstava, reakcija ili sličnih događaja do kojih je došlo upotrebom ovog proizvoda, uključujući i one koji nisu navedeni u ovom uputstvu za upotrebu, molimo da ih prijavite direktno kroz odgovarajuć sistem nadzora, odabirom odgovarajućeg autouteta u veći drži zdravci.

Način izveštavanja ovdje proizvod može izazvati osjetljivost kod nekih osoba. U slučaju takve reakcije treba prekinuti sa upotrebom proizvoda i obratiti se lekaru.