

Prior to use, carefully read the instructions for use.

EN

Преди употреба, внимателно прочетете инструкциите за употреба.

BG

Пред použitím si pečlivě přečtěte navod k použití.

CS

Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.

HR

Használat előtt az útmutatót olvassa el figyelmesen!

HU

Przed użyciem przeczytaj uważnie instrukcję stosowania.

PL

Înainte de utilizare, citiți cu atenție instrucțiunile de folosire.

RO

Внимательно прочтите инструкцию перед применением.

RU

GC Fuji™ COAT LC

LIGHT CURED PROTECTIVE COATING

For use only by a dental professional in the recommended indications.

INDICATIONS FOR USE

For the prevention of water and saliva contamination to exposed surfaces of glass ionomer cements during the first 24 hours after placement.

CONTRAINDICATIONS

Avoid use of this product in patients with known allergies to methacrylate monomer or methacrylate polymer.

DIRECTIONS FOR USE

- Place the glass ionomer cement according to the manufacturer's instructions.
- Using a cotton pellet or brush apply GC Fuji COAT LC to all exposed glass ionomer surfaces.
- Light cure for 10 seconds using suitable visible light curing device (>500 mW/cm²).
- Close bottle immediately after use.

STORAGE

Recommended for optimal performance, store in a cool and dark place (4-25°C) (39.2-77.0°F).

PACKAGE

Bottle of 5 g (5.2 mL)

CAUTION

1. GC Fuji COAT LC is FLAMMABLE. Avoid sources of ignition and do not store in direct sunlight.

2. In case of contact with oral tissue or skin, flush immediately with water.

3. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.

4. Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks and safety eyewear should always be worn.

5. In rare cases the product may cause sensitivity in some people. If any such reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a physician.

Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous according to GHS. Always familiarize yourself with the safety data sheets available at:

<http://www.gceurope.com>

They can also be obtained from your supplier.

CLEANING AND DISINFECTION

MULTI-USE DELIVERY SYSTEMS: to avoid cross-contamination between patients this device requires mid-level disinfection. Immediately after use inspect device and label for deterioration. Discard device if damaged.

DO NOT IMMERSE. Thoroughly clean device to prevent drying and accumulation of contaminants. Disinfect with a mid-level registered healthcare-grade infection control product according to regional/national guidelines.

For the Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP) please see EUDAMED database (<https://ec.europa.eu/tools/eudamed>) or contact us at:

Regulatory.gce@gc.dental

Desired effects- Reporting:

If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events experienced by use of this product, including those not listed in this instruction for use, please report them directly through the relevant vigilance system, by selecting the proper authority of your country accessible through the following link:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_enas well as to our internal vigilance system: vigilance@gc.dental

In this way you will contribute to improve the safety of this product.

Last revised: 10/2022

'GC'

MANUFACTURED BY
GC CORPORATION
76-1 Hasumina-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8585, JapanDISTRIBUTED BY
GC CORPORATION
76-1 Hasumina-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8585, JapanEU: GC EUROPE N.V.
Researchpark Haasrode-Leuven 1240, Interleuvenlaan 33,
B-3001 Leuven, Belgium TEL: +32 16 74 10 00

PRINTED IN JAPAN

Prior to use, carefully read the instructions for use.

EN

Преди употреба, внимателно прочетете инструкциите за употреба.

BG

Пред použitím si pečlivě přečtěte navod k použití.

CS

Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.

HR

Használat előtt az útmutatót olvassa el figyelmesen!

HU

Przed użyciem przeczytaj uważnie instrukcję stosowania.

PL

Înainte de utilizare, citiți cu atenție instrucțiunile de folosire.

RO

Внимательно прочтите инструкцию перед применением.

RU

GC Fuji™ COAT LC

ФОТОПОЛИМЕРИЗАЦИОНАЛНО ЗАЩИТНО ПОКРТИЕ

За употреба само от стоматолози за препоръчаните индикации.

ИНДИКАЦИИ ЗА УПОТРЕБА

За предотвратяване на замърсяване с вода и слюна на откритите повърхности на глас-йономерните цименти през първите 24 часа след поставянето им.

КОНТРАИНДИКАЦИИ

Не използвайте при пациенти с установени алергии към метакрилатен мономер или метакрилатен полимер.

НАСОСКА ЗА УПОТРЕБА

a) Поставете глас-йономерният цимент, съгласно инструкциите на производителя.

б) Като използвате памучен тунфил или нетка, нанесете GC Fuji COAT LC върху всички изложені глас-йономерни и оклони повърхности.

в) Светът за 10 секунди с използвани подходящи фотополимеризатори, с видима светлина (>500 mW/cm²).

г) Задържете бутиглите веднага след употреба.

СЪХРАНЕНИЕ

За оптимални резултати се препоръчва съхранявайте на хладно и тъмно място (4-25°C) (39.2-77.0°F).

ОПАКОВКА

Бутилка от 5 g (5.2 mL)

ВНИМАНИЕ

1. GC Fuji COAT LC е ВЪЗПЛАМЕННИМ. Избегвайте източници на искри и не съхранявайте на пряка слънчева светлина.

2. В случаи на контакт с оцелите тъкани или кожата, промийте веднага с вода.

3. В случаи на контакт с очите, промийте веднага с вода и потърсете медицинска помощ.

4. При лични предизвикателства (ППЕ) като ръкавици, маска и предлазни очила винаги тръбва да бъдат носени.

5. В редки случаи, продуктът може да предизвика сърцев чувствителност при никоя хора. При такива реакции прекратете употребата на продукта и потърсете лекарски помощ.

Някои продукти, споменати в настоящите инструкции, могат да бъдат определени като опасни съгласно GHS. Винаги се запознавайте с информационните данни за безопасност, налични на GHS. Винаги се запознавайте с инструкциите за безопасност, предоставени от производителя.

Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous according to GHS. Always familiarize yourself with the safety data sheets available at:

<http://www.gceurope.com>

They can also be obtained from your supplier.

CLEANING AND DISINFECTION

MULTI-USE DELIVERY SYSTEMS: to avoid cross-contamination between patients this device requires mid-level disinfection. Immediately after use inspect device and label for deterioration. Discard device if damaged.

DO NOT IMMERSE.

Thoroughly clean device to prevent drying and accumulation of contaminants. Disinfect with a mid-level registered healthcare-grade infection control product according to regional/national guidelines.

CLEANING AND DISINFECTION

ДОЗИРАНИЯ СИСТЕМИ СА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА: за да се избегне кристосано замърсяване между пациентите, устройството изисква средно ниво на дезинфекция.

Веднага след употреба инспектирайте устройството и етикета за влошаване на състоянието. Извършийте устройството, ако е увредено.

НЕ ОБЛИВАЙТЕ.

Почистете добре устройството, за да се предотврати изъхвърляне и натрупване на замърсители. Дезинфекцирайте с продукт за контрол на инфекции средно ниво, регистриран в ЕС. Дезинфекцирайте с продукт за контрол на инфекции средно ниво, регистриран в ЕС.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Дезинфекцирайте устройството и етикета за влошаване на състоянието.

ДОЗИРАНИЯ СИСТЕМИ СА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА: за да се избегне кристосано замърсяване между пациентите, устройството изисква средно ниво на дезинфекция.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Дезинфекцирайте устройството и етикета за влошаване на състоянието.

ДОЗИРАНИЯ СИСТЕМИ СА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА: за да се избегне кристосано замърсяване между пациентите, устройството изисква средно ниво на дезинфекция.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Дезинфекцирайте устройството и етикета за влошаване на състоянието.

ДОЗИРАНИЯ СИСТЕМИ СА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА: за да се избегне кристосано замърсяване между пациентите, устройството изисква средно ниво на дезинфекция.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Дезинфекцирайте устройството и етикета за влошаване на състоянието.

ДОЗИРАНИЯ СИСТЕМИ СА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА: за да се избегне кристосано замърсяване между пациентите, устройството изисква средно ниво на дезинфекция.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Дезинфекцирайте устройството и етикета за влошаване на състоянието.

ДОЗИРАНИЯ СИСТЕМИ СА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА: за да се избегне кристосано замърсяване между пациентите, устройството изисква средно ниво на дезинфекция.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Дезинфекцирайте устройството и етикета за влошаване на състоянието.

ДОЗИРАНИЯ СИСТЕМИ СА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА: за да се избегне кристосано замърсяване между пациентите, устройството изисква средно ниво на дезинфекция.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Дезинфекцирайте устройството и етикета за влошаване на състоянието.

ДОЗИРАНИЯ СИСТЕМИ СА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА: за да се избегне кристосано замърсяване между пациентите, устройството изисква средно ниво на дезинфекция.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Дезинфекцирайте устройството и етикета за влошаване на състоянието.

Prior to use, carefully read the instructions for use.

BG

Преди употреба, внимателно прочетете инструкциите за употреба.

CS

Пред použitím si pečlivě přečtěte navod k použití.

HR

Használat előtt az útmutatót olvassa el figyelmesen!

HU

Prje uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu.

RO

Înainte de utilizare, citiți cu atenție instrucțiunile de folosire.

RU

Внимательно прочтите инструкцию перед применением.

GC Fuji™ COAT LC

СВЕТЛЕМ ТУННОУЧИ ОЧРАННЫЙ ЛАК

SVETLÉM TUHNOCÍ OCHRANNÝ LAK

SVETLOSNO POLIMERIZUJACIJA ZAŠTITNI LAK ZA ISPUNE IZ STAKLENOIONOMERNOG CEMENTA

SVETLOSLNO POLIMERIZUJACI LAK ZA ISPUNE IZ STAKLENOIONOMERNOG CEMENTA

SVETLOSLNO POLIMERIZUJACI LAK ZA ISPUNE IZ STAKLENOIONOMERNOG CEMENTA

SVETLOSLNO POLIMERIZUJACI LAK ZA ISPUNE IZ STAKLENOIONOMERNOG CEMENTA

SVETLOSLNO

Pred použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie.

SK

GC Fuji™ COAT LC

SVETLOM TUHÚCÍ OCHRANNÝ LAK

Na použitie len v stomatologickej praxi v doporučených indikáciach.

INDIKÁCIE PRE POUŽITIE

Ochrana odkrytých plôch skloionomérnych cementov pred kontamináciou vodou a silinami počas prvých 24 hodín od umiestnenia.

KONTRAINDIKÁCIE

Tento výrobok nepoužívajte u pacientov s preukázanou alergiou na metakrilátový monomer alebo metakrylátový polymér.

NÁVOD NA POUŽITIE

- Skloionomérny cement aplikujte podľa pokynov výrobcu.
- Vatovým tampoňom alebo stetickom naneste GC Fuji COAT LC na všetky odkryté skloionomérne a príslušné plôchy.
- 10 sekúnd vytvrdzujte vzhľadom polymerizačnou lampou (>500 mW/cm²).
- Takto po upori steklenicke zaprie.

USKLADNENIE

Pre zachovanie optimálnych vlastností skladujte na chladnom a tmavom mieste (4-25°C) (39,2-77,0°F).

BALENIE

Flaštička 5 g (5,2 ml)

UPOZORNENIE

- GC Fuji COAT LC je HORĽAVÝ. Chráňte pred zdrojmi zapálenia a neskladujte na priamu slnečnú svetlosť.
- V prípade zasaiahnutia ústnej sliznice alebo pokožky ihned opláchnite vodom.
- V prípade zasaiahnutia očí ihned vyspláchnite vodom a vyhľadajte lekársku pomoc.
- Vždy používajte ochranné pomôcky ako rukavice, rúška a ochranný kryt očí.
- Ak sa vyskytne takáto reakcia, prerušte používanie výrobku a vyhľadajte lekára.

Nebezpečnosť výrobku uvádzaná v návode na použitie, môžu byť klasifikované ako nebezpečné podľa GHS. Vždy sa oboznámte s bezpečnostnými kartami, ktoré sú k dispozícii na adresi:

<http://www.gc-europe.com>

Možete ich tiež získať od svojho dodávateľa.

ČISTENIE A DEZINFEKCIЯ:

DÁVKOVACIE SYSTEМY PRE VIACNÁSOBNÉ POUŽITIE: aby sa zabránilo krízovej kontamínacií medzi pacientmi vyzádjujúť tieň dávkovacie systémy strednú - úroveň dezinfekcie. Ihned po použítiu skontrolujte, či nie je dávkovací systém a štítko poškodený. V prípade poškodenia, ho ihned zlikvidujte.

NEPONÁRAJTE DO TEKUTIN. Dávkovací systém dôkladne očistite, aby sa zabránilo vysýchaniu a hromadeniu nečistôt. Dezinfikujte s registrovanými zdravotními prostriedkami na strednej úrovni dezinfekcie v závislosti na regionálnych / národných smerniciach.

Súhrn bezpečnosti a klinického výkonu (SSCP) nájdete v databázbe EUDAMED (<https://ec.europa.eu/tools/eudamed>) alebo nás kontaktujte na adresu Regulatory.gce@gc.dentalHlásenie nežiaducích účinkov:
Porocilo o nežiaducích účinkoch:
Cieľom je informovať o nežiaducích účinkoch, reakciach alebo podobných udalostach, pri používaní tohto výrobku v rámci tých, ktoré nie sú uvedené v tomto návode na použitie, o ktorých ich priamo cez príslušnú vigilance systém, zadali sme správnej autoriteť Vašej krajiny, na nasledujúcom linku:https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_sl
Týmto spôsobom prispriejte k zvýšenej bezpečnosti tohto výrobku.

Naposlasy upravené: 10/2022

Pred uporabo previdno preberite navod za uporabo.

SL

GC Fuji™ COAT LC

ZAŠČITNI PREMAZ S SVETLOBNO POLIMERIZACIJO

Uporaba samo za profesionale namene in za priporočene indikacije.

INDIKÁCIE ZA UPORABO

Preprečevanje kontamínacie izpostavljených površín steklasto ionomerných cementov z vodo v slino v prvih 24 urah.

KONTRAINDIKÁCIE

Ne uporabljajte tega izdelka pri pacientih z znano alergijo na metakrilatno monomerom ali metakrilatne polimere.

NÁVODA ZA UPORABO

- Namestite steklasto ionomer cement na navodilov prizvajalcu.
- S pomočjo vatnje kroglice ali čopica nanesite GC Fuji COAT LC na vse izpostavljene steklasto ionomerne in sosedne površine.
- Svetlobno polimerizirajte 10 sekund z lučko z vidno svetlobo (>500 mW/cm²).
- Tako po upori stekleničko zaprite.

SHRANJEVANJE

Za optimalen rezultat priporočljivo shranjujte v hladnom in temnem prostoru (4-25°C) (39,2-77,0°F).

BALENIE

Flaštička 5 g (5,2 ml)

UPOZORNENIE

- GC Fuji COAT LC je VNETLIVÝ. Izogibajte se virom gorenja in ne shranjujte ga na priamu slnečnú svetlosť.
- V prípade zasaiahnutia ústnej sliznice alebo pokožky ihned opláchnite vodom.
- V prípade zasaiahnutia očí ihned vyspláchnite vodom a vyhľadajte lekársku pomoc.
- Vždy používajte ochranné pomôcky ako rukavice, rúška a ochranný kryt očí.
- Ak sa vyskytne takáto reakcia, prerušte používanie výrobku a vyhľadajte lekára.

Nebezpečnosť výrobku uvádzaná v návode na použitie, môžu byť klasifikované ako nebezpečné podľa GHS. Vždy sa oboznámte s bezpečnostnými kartami, ktoré sú k dispozícii na adresi:

<http://www.gc-europe.com>

Možete ich tiež získať od svojho dodávateľa.

ČISTENIE A DEZINFEKCIЯ:

DÁVKOVACIE SYSTEМY PRE VIACNÁSOBNÉ POUŽITIE: aby sa zabránilo krízovej kontamínacií medzi pacientmi vyzádjujúť tieň dávkovacie systémy strednú - úroveň dezinfekcie. Ihned po použítiu skontrolujte, či nie je dávkovací systém a štítko poškodený. V prípade poškodenia, ho ihned zlikvidujte.

NEPONÁRAJTE DO TEKUTIN. Dávkovací systém dôkladne očistite, aby sa zabránilo vysýchaniu a hromadeniu nečistôt. Dezinfikujte s registrovanými zdravotními prostriedkami na strednej úrovni dezinfekcie v závislosti na regionálnych / národných smerniciach.

Súhrn bezpečnosti a klinického výkonu (SSCP) nájdete v databázbe EUDAMED (<https://ec.europa.eu/tools/eudamed>) alebo nás kontaktujte na adresu Regulatory.gce@gc.dentalHlásenie nežiaducích účinkov:
Porocilo o nežiaducích účinkoch:
Cieľom je informovať o nežiaducích účinkoch, reakciach alebo podobných udalostach, pri používaní tohto výrobku v rámci tých, ktoré nie sú uvedené v tomto návode na použitie, o ktorých ich priamo cez príslušnú vigilance systém, zadali sme správnej autoriteť Vašej krajiny, na nasledujúcom linku:https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_sl
Týmto spôsobom prispriejte k zvýšenej bezpečnosti tohto výrobku.

Naposlasy upravené: 10/2022

Pred upotrebo pažljivo prečitate uputstvo.

SR

GC Fuji™ COAT LC

SVETLOSNO POLIMERUJUĆI ZAŠTITNI LAK ZA ISPUNE OD GLASJONOMER CEMENTA

Samo za stručnu upotrebu kod navedenih indikacija.

INDIKACIJE ZA UPOTREBU

Preprečivanje kontamínacije izpostavljenih površina steklasto ionomernih cementova z vodo u slini u prvih 24 urah.

KONTRAINDIKACIJE

Ne uporabljajte tega izdelka pri pacientih z znano alergijo na metakrilatno monomerom ali metakrilatne polimere.

NÁVODA ZA UPORABO

- Namestite steklasto ionomer cement na navodilov prizvajalcu.
- S pomočjo vatnje kroglice ali čopica nanesite GC Fuji COAT LC na sve izpostavljene steklasto ionomerne in sosedne površine.
- Svetlobno polimerizirajte 10 sekund z lučko z vidno svetlobo (>500 mW/cm²).
- Tako po upori stekleničko zaprite.

SHRANJEVANJE

Za optimalen rezultat priporočljivo shranjujte v hladnom in temnem prostoru (4-25°C) (39,2-77,0°F).

BALENIE

Flaštička 5 g (5,2 ml)

UPOZORNENIE

- GC Fuji COAT LC je VNETLIVÝ. Izogibajte se virom gorenja in ne shranjujte ga na priamu slnečnú svetlosť.
- V prípade zasaiahnutia ústnej sliznice alebo pokožky ihned opláchnite vodom.
- V prípade zasaiahnutia očí ihned vyspláchnite vodom a vyhľadajte lekársku pomoc.
- Vždy používajte ochranné pomôcky ako rukavice, rúška a ochranný kryt očí.
- Ak sa vyskytne takáto reakcia, prerušte používanie výrobku a vyhľadajte lekára.

Nebezpečnosť výrobku uvádzaná v návode na použitie, môžu byť klasifikované ako nebezpečné podľa GHS. Vždy sa oboznámte s bezpečnostnými kartami, ktoré sú k dispozícii na adresi:

<http://www.gc-europe.com>

Možete ich tiež získať od svojho dodávateľa.

ČISTENIE A DEZINFEKCIЯ:

DÁVKOVACIE SYSTEМY PRE VIACNÁSOBNÉ POUŽITIE: aby sa zabránilo krízovej kontamínacií medzi pacientmi vyzádjujúť tieň dávkovacie systémy strednú - úroveň dezinfekcie. Ihned po použítiu skontrolujte, či nie je dávkovací systém a štítko poškodený. V prípade poškodenia, ho ihned zlikvidujte.

NEPONÁRAJTE DO TEKUTIN. Dávkovací systém dôkladne očistite, aby sa zabránilo vysýchaniu a hromadeniu nečistôt. Dezinfikujte s registrovanými zdravotními prostriedkami na strednej úrovni dezinfekcie v závislosti na regionálnych / národných smerniciach.

Súhrn bezpečnosti a klinického výkonu (SSCP) nájdete v databázbe EUDAMED (<https://ec.europa.eu/tools/eudamed>) alebo nás kontaktujte na adresu Regulatory.gce@gc.dentalHlásenie nežiaducích účinkov:
Porocilo o nežiaducích účinkoch:
Cieľom je informovať o nežiaducích účinkoch, reakciach alebo podobných udalostach, pri používaní tohto výrobku v rámci tých, ktoré nie sú uvedené v tomto návode na použitie, o ktorých ich priamo cez príslušnú vigilance systém, zadali sme správnej autoriteť Vašej krajiny, na nasledujúcom linku:https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_sl
Týmto spôsobom prispriejte k zvýšenej bezpečnosti tohto výrobku.

Naposlasy upravené: 10/2022

Pred začasťou užívania užívajte instrukciu z využitím.

UK

GC Fuji™ COAT LC

ZAHÝSILNÝ LAK SVITLOVOGO TVERDÍNIA

Samo za stručnu upotrebu kod navedenih indikacija.

INDIKACIJE ZA UPOTREBU

Za sprečavanje prijazne površine glasjonomer cementa vodom ili salivom tokom prva 24 sata posle primene.

KONTRAINDIKACIJE

Ne uporabljajte tega izdelka pri pacientih z pôvodnou alergiou na monomer ali metakrilatne polimere.

NÁVODA ZA UPOTREBU

- Namestite steklasto ionomer cement na navodilov prizvajalcu.
- S pomočjo vatnje kroglice ali čopica nanesite GC Fuji COAT LC na sve izpostavljene steklasto ionomerne in sosedne površine.
- Svetlobno polimerizirajte 10 sekund z lučko z vidno svetlobo (>500 mW/cm²).
- Tako po upori stekleničko zaprite.

SHRANJEVANJE

Za optimalen rezultat priporočljivo shranjujte v hladnom in temnem prostoru (4-25°C) (39,2-77,0°F).

BALENIE

Flaštička 5 g (5,2 ml)

UPOZORNENIE

- GC Fuji COAT LC je VNETLIVÝ. Izogibajte se virom gorenja in ne shranjujte ga na priamu slnečnú svetlosť.
- V prípade zasaiahnutia ústnej sliznice alebo pokožky ihned opláchnite vodom.
- V prípade zasaiahnutia očí ihned vyspláchnite vodom a vyhľadajte lekársku pomoc.
- Vždy používajte ochranné pomôcky ako rukavice, rúška a ochranný kryt očí.
- Ak sa vyskytne takáto reakcia, prerušte používanie výrobku a vyhľadajte lekára.

Nebezpečnosť výrobku uvádzaná v návode na použitie, môžu byť klasifikované ako nebezpečné podľa GHS. Vždy sa oboznámte s bezpečnostnými kartami, ktoré sú k dispozícii na adresi:

<a href="