

Kako izgleda MIH?

Zubi zahvaćeni MIH-om imaju vrlo tipičan izgled od kada se pojave u ustima:

- vrlo bele ili žuto/smeđe mat mrlje, često neugledne
- osetljivost i/ili bol kod zahvaćenih zuba
- brzo može da se razvije zubni karijes
- delovi zuba mogu da se odlome



Slike: Ustupio Dr. P. Rouas, Francuska i Prof. C. Baroni, Italija

U kom dobu se javlja?

Zubi koji mogu biti zahvaćeni MIH-om niču u dobu od 5-7 godina; MIH se može dijagnostikovati od tog trenutka. Mlečni zubi mogu da imaju iste defekte koji mogu da se jave čak i u drugoj godini života!

Zašto ga ima moje dete?

Nažalost, još uvek se ne zna šta uzrokuje MIH pa se još ništa ne može učiniti za njegovu prevenciju. Međutim, ako dete ima MIH, verovatno će ga imati i njegovi brat ili sestra.

Zašto je potrebno brzo delovati?

Rana intervencija i prevencija su neophodne za izbegavanje nepotrebnog bola i straha od stomatologa. Dugoročno time će se smanjiti i troškovi, budući da zakasnela terapija može da zahteva invazivnije i skuplje postupke.

GC Tooth Mousse



GC MI Paste Plus



Dostupno u 5 ukusa: vanila, dinja, jagoda, nana i mešano voće



Žig ordinacije:

ZOLF RS 20 04 - 03/19



1 od 7 dece ima molarno incizivnu hipomineralizaciju (MIH)

Šta je tačno MIH?
Kako može da utiče na moje dete?
Zašto ga moje dete ima?

Šta kao roditelj mogu da učinim?



GC

Šta je tačno MIH?

MIH, poznata i pod nazivom "sirasti molari", je bolest u kojoj spoljni sloj (gleđi) zuba postaje mekan i porozan.

Takvi su zubi vrlo lomljivi pa ih lako mogu napasti bakterije uzročnici karijesa. U teškim slučajevima mogu i pući.

Kod trajnih zuba MIH se uvek javlja na trajnim prvim kutnjacima i ponekad i na sekutićima. U retkim slučajevima mlečni zubi mogu da imaju slične simptome.



Kako može da utiče na moje dete?

Zubi s MIH-om su često preosetljivi. Karijes može da se razvije vrlo brzo, što može da uzrokuje bol. Navike u ishrani i navike zubne higijene vašeg deteta mogu da se promene, jer će nastojati da izbegne bol.

Ako su zahvaćeni i sekutići, mrlje se vide tokom društvene interakcije (govor, smeh). To može da utiče na samopouzdanje vašeg deteta.



Šta kao roditelj mogu da učinim?

1. Posetite stomatologa!

Otiđite na pregled kod stomatologa. Rano otkrivanje i intervencija su ključni!

Stomatologa može da pomogne na sledeći način:



Obavestiti vas i naučiti vaše dete kako da se brine o svojim zubima.

Naneti zaštitni sloj za smanjenje osetljivosti zuba.



Ojačati zube nanošenjem proizvoda koji ojačavaju gleđ.

Izraditi ispun u slučaju karijesa ili loma zuba.



2. Osigurajte zdravu ishranu koja ne šteti zubima

Treba izbegavati često uzimanje hrane ili pića između obroka, posebno hrane sa visokim udelom šećera ili kiseline.

3. Proverite zubnu higijenu svog deteta

Zube treba prati dvaput na dan zubnom pastom koja sadrži potrebnu količinu fluorida (pitajte stomatologa). Vodite računa da manja deca još uvek mogu da zahtevaju pomoć u pranju zuba.


4. Ojačajte zube kod kuće pomoću GC Tooth Mousse ili MI Paste Plus

GC Tooth Mousse i MI Paste Plus sadrže Recaldent™, izrađen iz prirodnih mlečnih proteina. Pomaže u jačanju zuba kod oslabljene gleđi, kao u slučaju MIH-a.



Oba proizvoda ne sadrže laktozu, ali ne mogu da ih koriste pacijenti alergični na mlečne proteine.

MI Paste Plus sadrži i fluorid (900 ppm). Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre nanošenja.



Tooth Mousse i MI Paste Plus nisu u redovnoj prodaji. Pitajte stomatologa kako možete da ih nabavite.

Krenite u akciju!
Dogovorite posetu svog deteta stomatologu već sada!