

Prior to use, carefully read the instructions for use. EN

Преди употреба внимателно прочетете инструкциите за употреба. BG

Pred použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. CS

Prije uporabe pažljivo pročitajte upute za uporabu. HR

Használat előtt az útmutatót olvassa el figyelmesen! HU

Przed użyciem przeczytaj uważnie instrukcję stosowania. PL

Inainte de utilizare, cititi cu atentie instructiunele de folosire. RO

Внимательно прочтите инструкцию перед применением. RU

REBARON

SELF-CURING ACRYLIC FOR DIRECT REBASING

For use only by a dental professional in the recommended indications.

RECOMMENDED INDICATIONS

For the rebasing (relining) of acrylic dentures.

CONTRAINDICATIONS

Avoid use of this product in patients with known allergies to methacrylate monomer or methacrylic polymer.

DIRECTIONS FOR USE

- Check the fit in the mouth using FIT CHECKER (II) or a thinly mixed alginate impression material.
- Mark the boundary between thick and thin layers using a round bur.
- Clean the cavity thoroughly using pumice and water and shade the area to be rebased. (Pressure relief holes may be drilled in areas of extensive undercuts).
- Protect the tooth and gingival areas of the denture with COCOA BUTTER, and apply local anaesthetic or glycerine to the patient's mucous membrane contact areas to prevent irritation.
- MIXING
 - a) The standard powder/liquid ratio is 1.5 g/1.0 mL, (half a measuring cup of powder to 1/3 of a syringe of liquid).
 - Note: Excessive quantities of liquid can cause strong irritation.
 - b) Measure into the jar and mix for 20-30 seconds.
- REBASING
 - a) After mixing, coat the mixture onto the denture and leave it until the denture has lost its sheen (about 30 seconds).
 - b) When the surface is dull, insert the denture into the mouth and make muscle trimming in the centric occlusal position.
 - c) Wait at least 2 minutes before carefully removing the denture. Correct the periphery.
 - d) Re-insert the denture in the mouth, and retain it in the centric occlusal position for about 2 minutes.
 - Note: If the heat generated causes the patient discomfort, allow the denture to cure outside the mouth.
 - e) REBARON will cure completely in about 9 minutes from start of mixing. Perform final correction and polishing using standard techniques.

STORAGE
Recommended for optimal performance, store in a cool place away from direct sunlight (4-25°C) (39.2-77.0°F).

SHADES
No. 3 - Pink
No. 8 - Live pink
Pink X

PACKAGES
1. Bottle of 100 g powder
2. Bottle of 100 g (104 mL) liquid
3. 1-1 package: 100 g powder, 100 g (104 mL) liquid, plus accessories

Note:
All packaging types may not be available in all countries.

CAUTION
1. The liquid is volatile and highly flammable. Close the bottle immediately after use and keep away from sources of ignition.
2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical protection (PPE) such as gloves, face masks and safety eyewear should always be worn.
3. In rare cases the product may cause sensitivity in some people. If any such reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a physician.

Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous according to GHS. Always familiarize yourself with the safety data sheets available:
<http://www.gc-europe.com>

They can also be obtained from your supplier.

CLEANING AND DISINFECTION:
MULTI-LEVEL DELIVERY SYSTEMS: to avoid cross-contamination between patients this device requires mid-level disinfection. Immediately after use inspect device and label for deterioration. Discard device if damaged. DO NOT IMMERSER. Thoroughly clean device to prevent drying and accumulation of contaminants. Disinfect with a mid-level registered healthcare-grade infection control product according to regional/national guidelines.

Undesired effects- Reporting:
If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events experienced by use of this product, including those not listed in this document, please report them directly through the relevant vigilance system, by selecting the proper authority of your country accessible through the following link:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en as well as to our internal vigilance system: vigilance@gc.dental

Last revised: 07/2019

MANUFACTURED by:
GC DENTAL PRODUCTS CORP.
2-285 Torimatsu-cho, Kasugai, Aichi 486-0844, Japan

DISTRIBUTED by:
GC CORPORATION
76-1 Hasumuna-cho, Itabashi-ku, Tokyo 148-8585, Japan

EU: GC EUROPE N.V.
Researchpark Haasrode-Leeuwen 1240, Interleuvenlaan 33,
B-3001 Leuven, Belgium. TEL: +32 26 74 10 00

PRINTED IN JAPAN

REBARON

САМОПОЛИМЕРИЗАЩА АКРИЛНА ПЛАСТМАСА ЗА ДИРЕКТНО РЕБАЗИРАНЕ

За употреба само от дентални специалисти за препоръчаните индикации.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ИНДИКАЦИИ

За ребазиране на акрилни протези.

КОНТРАИНДИКАЦИИ

За използване при пациенти с установени алергии към метакрилатен мономер или метакрилатен полимер.

DIRECTIONS FOR USE

- ПРЕПАРАЦИЯ
 - a) Проверете съвпадение в устата, като използвате FIT CHECKER (II) или фин алгинатен материал.
 - b) Очистете дълбоките подложки, като използвате пясък и вода и създадете място за ребазиране. (Pressure relief holes may be drilled in areas of extensive undercuts).
 - c) Защитете зъбите и десните зъби с COCOA BUTTER, и приложете локална анестетична или глицеринова мукозна обработка на контактните зони.
 - d) Създадете място за ребазиране, като използвате COCOA BUTTER, и приложете локална анестетична или глицеринова мукозна обработка на контактните зони.
- МЕРИДИАН
 - a) Стандартен прах/жидък съотношение е 1.5 g/1.0 mL, (половина одимерка на мономер и половина на полимер).
 - b) Измерете количество праха и водата и смесете ги.
 - c) Създадете място за ребазиране, като използвате COCOA BUTTER, и приложете локална анестетична или глицеринова мукозна обработка на контактните зони.
- ПРИГОДА
 - a) Създадете място за ребазиране, като използвате FIT CHECKER (II) или фин алгинатен материал.
 - b) Измерете количество праха и водата и смесете ги.
 - c) Създадете място за ребазиране, като използвате COCOA BUTTER, и приложете локална анестетична или глицеринова мукозна обработка на контактните зони.
- ПРИГОДА НА УПОТРЕБА
 - a) Проверете съвпадение в устата, като използвате FIT CHECKER (II) или фин алгинатен материал.
 - b) Измерете количество праха и водата и смесете ги.
 - c) Създадете място за ребазиране, като използвате COCOA BUTTER, и приложете локална анестетична или глицеринова мукозна обработка на контактните зони.

HASOCKI ZA UPUTREBU

1. ПРЕПАРАЦИЈА

- a) Проверете съвпадение в устата, като използвате FIT CHECKER (II) или фин алгинатен материал.
- b) Измерете количество праха и водата и смесете ги.
- c) Създадете място за ребазиране, като използвате COCOA BUTTER, и приложете локална анестетична или глицеринова мукозна обработка на контактните зони.

- 2. МЕРИДИАН
- a) Стандартен прах/жидък съотношение е 1.5 g/1.0 mL, (половина одимерка на мономер и половина на полимер).
- b) Измерете количество праха и водата и смесете ги.
- c) Създадете място за ребазиране, като използвате COCOA BUTTER, и приложете локална анестетична или глицеринова мукозна обработка на контактните зони.
- 3. ПРИГОДА
- a) Проверете съвпадение в устата, като използвате FIT CHECKER (II) или фин алгинатен материал.
- b) Измерете количество праха и водата и смесете ги.
- c) Създадете място за ребазиране, като използвате COCOA BUTTER, и приложете локална анестетична или глицеринова мукозна обработка на контактните зони.
- 4. ПРИГОДА НА УПОТРЕБА
- a) Проверете съвпадение в устата, като използвате FIT CHECKER (II) или фин алгинатен материал.
- b) Измерете количество праха и водата и смесете ги.
- c) Създадете място за ребазиране, като използвате COCOA BUTTER, и приложете локална анестетична или глицеринова мукозна обработка на контактните зони.

HASZNÁLATI UTÁMATÓ

1. ELŐKÉSZÍTÉSE

- a) Szűrje ki a fogszor illeszkedését a szájban FIT CHECKER (II) vagy egy másik finom alginátos anyagot.
- b) Gránice izmád befejeződéséig mindenkor mindenkor..

PREPORUČENE INDIKACIJE

Za direktno podlaganje akrilnih proteza.

KONTRAINDIKACIJE

Za rebaziranje na akrilnim protezama.

PRIMENJIVANJE

Izbjegavati uporabu ovog proizvoda kod pacijenata s pozitatom alergijom na metakrilatni monomer ili metakrilatne polimere.

REBARON

САМОПОЛИМЕРИЗАЩА АКРИЛНА ПЛАСТМАСА ЗА ДИРЕКТНО РЕБАЗИРАНЕ

Који употреби је само у денталној практици за препоручене индикације.

DOPORUČENE INDIKACIJE

За ребазирање на акрилни протези.

KONTRAINDIKACIJE

За излагање на пациенти са чувством алергије кај метакрилатном мономеру или метакрилатним полимерима.

REBARON

САМОПОЛИМЕРИЗАЩА АКРИЛНА ПЛАСТМАСА ЗА ДИРЕКТНО РЕБАЗИРАЊЕ

Који употреби је само у денталној практици за препоручене индикације.

DOPORUČENE INDIKACIJE

За ребазирање на акрилни протези.

KONTRAINDIKACIJE

За излагање на пациенти са чувством алергије кај метакрилатном мономеру или метакрилатним полимерима.

REBARON

САМОПОЛИМЕРИЗАЩА АКРИЛНА ПЛАСТМАСА ЗА ДИРЕКТНО РЕБАЗИРАЊЕ

Који употреби је само у денталној практици за препоручене индикације.

DOPORUČENE INDIKACIJE

За ребазирање на акрилни протези.

KONTRAINDIKACIJE

За излагање на пациенти са чувством алергије кај метакрилатном мономеру или метакрилатним полимерима.

REBARON

САМОПОЛИМЕРИЗАЩА АКРИЛНА ПЛАСТМАСА ЗА ДИРЕКТНО РЕБАЗИРАЊЕ

Који употреби је само у денталној практици за препоручене индикације.

DOPORUČENE INDIKACIJE

За ребазирање на акрилни протези.

KONTRAINDIKACIJE

За излагање на пациенти са чувством алергије кај метакрилатном мономеру или метакрилатним полимерима.

REBARON

САМОПОЛИМЕРИЗАЩА АКРИЛНА ПЛАСТМАСА ЗА ДИРЕКТНО РЕБАЗИРАЊЕ

Који употреби је само у денталној практици за препоручене индикације.

DOPORUČENE INDIKACIJE

За ребазирање на акрилни протези.

KONTRAINDIKACIJE

За излагање на пациенти са чувством алергије кај метакрилатном мономеру или метакрилатним полимерима.

REBARON

САМОПОЛИМЕРИЗАЩА АКРИЛНА ПЛАСТМАСА ЗА ДИРЕКТНО РЕБАЗИРАЊЕ

