

Kuidas MIH välja näeb?

MIH-iga hammastel on väga spetsiifiline väljanägemine:

- väga valged või kollakaspruunid tuhmid laigud, mis on sageli ebameeldiva väljanägemisega
- kahjustunud hammaste tundlikkus ja/või valu
- uue hamba lagunemine võib toimuda kiirelt
- hammastest võib eralduda kilde



Pildid: Autor dr P. Rouas, France ja professor C. Baroni, Itaalia

Mis vanuses seda esineb?

MIH ohustab hambaid, mis lõikuvad 5–7 aastasel. Sellest vanusest alates on see tuvastatav. Piimahammaste puhul võib samalaadseid defekte ilmnedagi isegi 2-aastaselt.

Miks see mu lapsel on?

Kahjuks ei tea me veel, mis MIH-i põhjustab, mistõttu ei ole võimalik seda ennetada. Küll aga on MIH diagnoosiga laste õdede-vendade puhul suurem tõenäosus selle haiguse tekkeks.

Miks on vaja kiiresti tegutseda?

Varajane sekkumine ja ennetus on vajalik, et vältida tarbetut valu ja hirmu hambaravi ees. Pikas perspektiivis vähendab see ka kulusid, sest edasi lükatud ravi võib tingida vajaduse invasiivsemate ja kallimate protseduuride järele.

GC Tooth Mousse®



GC MI Paste Plus®



Saadaval 5 maitsega: vanill, melon, maasikas, münt, Tutti-Frutti



Praksise tempel:

MIH

Üks seitsmest lapsest kannatab molaarintsisiivi hüpominalisatsiooni (MIH) käes.

Mis on MIH?
Mida võib see mu lapsele teha?
Miks see mu lapsel on?
Mida ma vanemana teha saan?




Mis on MIH täpsemalt?

MIH on haigus, mille puhul hamba väline kiht (email) muutub pehmeks ja poorseks.

Sellised hambad on väga haprad ja kaitsetud kaariest tekitavate bakterite vastu. Raskete juhtumite puhul võivad hambad isegi laguneda!

Jäävhammade puhul ilmneb MIH alati esimestel purihammastel ja vahel ka lõikehammastel. Harvadel juhtudel võib ka piimahamastel esineda sarnaseid sümptomeid.



Mida võib see mu lapsele teha?

MIH-iga hambad on tihti ülitundlikud. Selliste hammaste puhul võib kaaries areneda väga kiiresti ja tekitada valu. Valu vältimiseks võib laps muuta koguni oma söömis- ja hammaste harjamisharjumusi.

Kui haigus hõlmab ka lõikehambaid, siis on plekid näha ka näiteks rääkides ja naeratades ning see võib mõjutada teie lapse enesekindlust.



Mida ma vanemana teha saan?

1. Külastage hambaarsti!

Minge hambaarsti vastuvõtule.

Varajane avastamine ja sekkumine on otsustava tähtsusega! Hambaarst saab aidata järgmistel viisidel:



ta jagab teile teavet ja õpetab lapsele, kuidas hammaste eest hoolitseda;

ta kannab hammastele kaitselaki, et vähendada hammaste tundlikkust;



ta tugevdab hambaid toodetega, mis tugevdavad emaili;

ta saab hammaste lagunemise korral neid restaureerida.



2. Pakkuge tervislikku ja hambaid säästvat toitu

Tuleks vältida sagedast näksimist ja karastusjooke/mahlasid söögikordade vahel. Eriti selliseid, mis sisaldavad palju suhkrut või on happelised.

3. Kontrollige oma lapse suuhügieeni

Hambaid tuleks harjata kaks korda päevas hambapastaga, mis sisaldab õiges koguses fluoriidi (küsi selle kohta hambaarstilt). Ärge unustage, et väikesed lapsed võivad vajada abi hammaste pesemisest.

4. Tugevdage hambaid kodus GC Tooth Mousse'i või GC MI Paste Plusiga

GC Tooth Mousse ja GC MI Paste Plus sisaldavad naturaalsest piimavalkudest valmistatud Recaldent™-i. See aitab tugevdada nõrgenenud emailiga hambaid (nt MIH-iga hambaid). GC MI Paste Plus sisaldab ka fluoriidi (900 ppm).



Enne kasutamist lugege hoolikalt läbi kasutusjuhend. GC Tooth Mousse'i ja GC MI Paste Plus'i ei tohi kasutada patsientidel, kellel kahtlustatakse või on tõestatud allergia piimavalkudele või bensoadi säilitusainetele.



GC Tooth Mousse'i ja GC MI Paste Plusi ei müüda tavapoodides ega apteekides. Küsi hambaarstilt, kust neid osta saab!

Tegutsege!
Broneerige lapse hambaarstiviisiit kohe!