Tooth Mousse şi MI Paste Plus: pentru dinți sănătoşi şi zâmbet frumos

Aplicare
Dozați din tub o cantitate mică de Tooth Mousse pe deget şi aplicați pe suprafețele dentare, benzi şi bracketuri urmând sfatul medicului stomatolog. Folosiți limba pentru a dispersa pasta în zonele greu accesibile. Pentru beneficii maxime, mențineți pe dinți cât mai mult posibil.

Timpul de aplicare minim recomandat este de 3 minute. La sfârşitul aplicării puteți expectora sau înghiți restul de Tooth Mousse.

Întotdeauna închideți capacul tubului şi curățați excesul de Tooth Mousse din jurul vârfului.

Dr. D. Mahony, Australija

Sistem de protecție natural

Tooth Mousse şi MI Paste Plus
Tooth Mousse şi MI Paste Plus sunt creme/paste ce conțin acelaşi tip de calciu şi fosfat natural regăsit în lapte. MI Paste Plus include deasemenea şi fluor. Aceste minerale vă protejează dinții şi pot întări zonele slăbite care sunt deja demineralizate.

Recaldent

CPP-ACP a fost dezvoltat de School of Dental Science din cadrul Universității din Melbourne Victoria / Australia. RECALDENT™ este utilizat sub licență RECALDENT™ Pty Ltd. RECALDENT™ CPP-ACP este derivat din cazeină lactată, şi nu trebuie utilizat în cazul pacienților cu alergie la proteinele lactate şi/sau hidroxibenzoați.

Mi™

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B - 3001 Leuven
Tel.: +32.16.74.10.00
Fax: +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GC EEO - Romania
BD. N. Balcescu, nr. 5C
bl. Dunarea 1, ap. 57, se ct. 1
RO - Bucuresti
Tel. +40.21.315.93.15
Fax. +40.21.315.93.15
romania@eeo.gceurope.com
www.eeo.gceurope.com

z O LF RO 12 21 05/11

Dinți puternici, sănătoşi şi frumoşi în timpul şi după tratamentul ortodontic

Reduceți riscul apariției petelor albe cretoase utilizând produse de prevenție cum ar fi **Tooth Mousse** şi **MI Paste Plus**.

Parte a programului GC de Minimă Intervenție.

Menținerea sănătății dinților pe perioada tratamentului ortodontic

În timpul tratamentului ortodontic este important să vă mențineți dinții sănătoşi. Nimeni nu îşi doreşte pete albe cretoase pe dinți după tratament - acestea pot fi prevenite!

Petele albe cretoase ortodontice
Petele albe cretoase indică existența unei carii incipiente - zone în care dintele a pierdut minerale datorită acidului produs de bacteriile din placa bacteriană. Acest lucru se întâmplă în principal în zonele adiacente bracketurilor acolo unde placa bacteriană se fixează cu uşurință.

Decalcifiere post-ortodontică

După utilizarea regulată de Tooth Mousse

Prof. L. Walsh, Universitatea Queensland, Australia

Ştiința din spatele zâmbetului
A fost realizat un test clinic referitor la utilizarea lui Tooth Mousse şi MI Paste Plus pentru regresia petelor albe cretoase[1], şi eficiența în reducerea efectelor negative ale acumulării de placă bacteriană în timpul tratamentului ortodontic[2].

Aşa arată smaltul care prezintă pete albe cretoase observat la un microradiograf

În cazul tratamentului exclusiv cu fluor, mineralele au tendința să se depoziteze pe suprafața externă a petei albe cretoase



În cazul tratamentului cu Tooth Mousse, mineralele penetrează în profunzimea petei albe cretoase

1. Bailey, D. L., Adams, G. G., Tsao, C. E., Hyslop, A., Escobar, K., Manton, D. J., Reynolds, E. C. & Morgan, M. V. (2009) Regression of Post orthodontic lesions by a remineralising crème. J Dent Res 88(12):1148-1153.
2. van der Veen MH, Beerens MW, van Beek H, ten Cate JM. (2009) Changes in Plaque Composition after Orthodontic treatment; the influence of CPP-ACP-F Paste. Caries Res, 43:179-244 abstr 57.

O dietă sănătoasă pentru dinți sănătoşi

O dietă sănătoasă pe perioada tratamentului ortodontic vă ajută să vă mențineți dinții într-o formă bună.

Sfaturi pentru o dietă sănătoasă:

- Mâncați fructe şi legume
- Beți sucuri de fructe şi alte băuturi neîndulcite
- Beți lichide îndulcite artificial şi evitați-le pe cele care conțin zahăr
- Evitați alimentele, dulciurile şi snacks-urile care conțin zahăr
- Evitați snacks-urile şi dulciurile care rămân lipite de dinți (de exemplu caramelele)

Menținerea dinților curați pe perioada tratamentului ortodontic

Perierea şi folosirea aței dentare
Periați-vă dinții cu atenție, de două ori pe zi, folosind o periuță moale, inclusiv în zonele adiacente bracketurilor şi sârmelor. Dacă purtați elastice, acestea trebuie îndepărtate înainte de periere şi de folosirea aței dentare şi apoi reaplicate imediat. Perierea dinților cu o pastă de dinți cu fluor ajută deasemenea la prevenirea apariției petelor albe cretoase.

Folosiți deasemenea ața dentară cel puțin o dată pe zi. Sunt disponibile produse speciale care vă pot ajuta să curățați spațiile dintre sârme şi zona gingivală. Pentru sfaturi şi recomandări întrebați ortodontul dumneavoastră şi medicul stomatolog.

Controlul plăcii bacteriene
Gelul revelator de placă evidențiază placa bacteriană din cavitatea orală prin colorarea acesteia în roz-purpuriu sau albastru. Placa bacteriană veche de cel puțin 24 - 48 ore este mai periculoasă şi conține mai multe bacterii; această placă se va colora în albastru şi nu în roz.

Puteți utiliza deasemenea gelul revelator de placă pentru a măsura pH-ul plăcii bacteriene - acest lucru vă va oferi informații referitoare la zona în care bacteriile produc cea mai mare cantitate de acid determinând deteriorarea dinților.

Dr. I. Miletić, Croatia

Utilizarea gelului revelator de placă acasă vă ajută la identificarea plăcii bacteriene în zonele greu accesibile din jurul bracketurilor şi elasticelor şi vă indică zonele care necesită extra atenție.